

**BEITRAG**  
ZUR  
**KÄFER-FAUNA**  
DER ALEUTISCHEN INSELN, DER INSEL SITKHA  
UND  
**NEU-CALIFORNIENS**  
VON GRAF C. G. MANNERHEIM.

---

Obgleich der Herr Professor Doctor *Johann Friedrich Eschscholtz* erst in seinen Entomographien (\*) und hernach in dem von ihm herausgegebenen zoologischen Atlas zur zweiten Reise des Herrn Flott-Capitains *Otto von Kotzebue* (\*\*) eine Menge, während der beiden mit genanntem Herrn Capitain zurückgelegten Reisen um die

---

(\*) Entomographien von *J. Friedrich Eschscholtz*. Erste Lieferung. Berlin, 1842. in-8°.

(\*\*) Zoologischer Atlas, enthaltend Abbildungen und Beschreibungen neuer Thierarten, während der Flott-Capitains von Kotzebue zweiter Reise um die Welt, beobachtet von Dr. *Friedrich Eschscholtz*. Fünf Hefte in Folio. Berlin, 1829—1833.

Welt, gemachten entomologischen Entdeckungen veröffentlicht hatte, blieb doch ein grosser Theil des gesammelten Materials unbenuzt liegen, da am 7<sup>ten</sup> Mai 1831 der Tod diesen thätigen Mann dahinraffte und so der Naturgeschichte einen der gründlichsten und ausgezeichnetesten Entomologen unseres Zeitalters entriss. Die persönliche Bekanntschaft, die ich mit dem Herrn Doctor *Eschscholtz*, schon vor seiner zweiten Reise um die Welt, anknüpfte und die seine freundschaftlichen Gesinnungen gegen mich mit jedem Tage vermehrte, von denen ich die angenehmsten Erinnerungen durch das ganze Leben behalten werde, gab die Veranlassung zu einem fleissigen Briefwechsel zwischen uns. Auch während der Weltumschiffung von 1823 bis 1826 theilte er mir in Briefen aus Sitkha und Californien die von ihm auf der Reise gemachten überaus interessanten entomologischen Beobachtungen mit, und heimgekehrt bereicherte er vorzugsweise meine Sammlung mit seinen vielen neuen Entdeckungen, so dass mein entomologisches Kabinet eines der vollständigsten in Hinsicht derselben werden musste. Seitdem unterhielt er mit mir über diese Gegenstände eine äusserst lehrende Correspondenz und oftmals war ich gesonnen die daraus gezogenen Aufklärungen über die entomologischen Schätze dieser entlegenen Gegenden im Druck bekannt zu machen. Allein es kamen mir manche Hindernisse in den Weg, die diese Absicht vereitelten. Lange waren unsere

Kenntnisse der Insecten dieser von dem stillen Oceane bewässerten, in der nördlichen Hemisphäre liegenden Küsten- und Insel-Länder nur auf die von *Eschscholtz* daselbst eingesammelten Arten beschränkt, bis im Herbste 1841 der aus Sitzka heimgekehrte Doctor *Blaschke* eine Sammlung von genannter Insel und von Californien mitbrachte, wovon eine schöne Reihenfolge der interessantesten Käfer durch die, bei mir stets in der dankbarsten Erinnerung bewahrte, besondere Güte und Freundschaft S<sup>r</sup> Excellenz des Herrn wirklichen Staats-Raths Doctor *Lange* mir zu Theil wurde.—Fast zu gleicher Zeit hatte der gewesene Gouverneur der Besitzungen der russisch-amerikanischen Compagnie, Herrn Flott-Capitain ersten Ranges *Kuprianoff*, die ausgezeichnete Gefälligkeit mir eine Menge der von ihm aus Sitzka mitgebrachten Insecten zu verehren und es gereicht mir zur angenehmsten Pflicht, diesem für die Kenntniss der Naturerzeugnisse der seiner Verwaltung anvertrauten Länder so thätigen Manne meine ganz besondere Erkenntlichkeit für diese mir erzielte Güte hiemit öffentlich abzustatten. Bevor noch diese jetzt erwähnten Sendungen bei mir eingingen, erwies der Herr Flott-Capitain-Lieutenant *Behrens* mir die Freundschaft einige von seinem Reisegefährten nach Sitzka und Californien, dem Herrn Doctor *Fischer*, in der vormaligen russischen Colonia Ross eingesammelten und in Weingeist aufbewahrten Käfer zu

schicken, von welchen ich zwei ausgezeichnete Arten in der *Revue zoologique par la Société Cuvierienne, année 1840.* S. 137. schon beschrieben habe.

Mit diesen zusammengebrachten Materialien ausgestattet beabsichtigte ich eine Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln, der Insel Sitkha und der mit der russisch-amerikanischen Compagnie in Beziehung gestandenen Theile Neu-Californiens auszuarbeiten und zugleich in dieses Werk alles zusammenzubringen, was in verschiedenen entomologischen Schriften über die Käfer dieser Gegenden bisher geliefert worden ist. Mit diesem Entschlusse wandte ich mich an Seine Excellenz, den Herrn wirklichen Staats-Rath *Fischer von Waldheim*, Vice-President der Kayserl. naturforschenden Gesellschaft zu Moskau und an Herrn *Ménétriés*, Conservator des entomologischen Museums der Kayserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, um die in den unter ihrer Aufsicht stehenden Sammlungen etwa vorhandenen Käfer der gedachten Länder in die erwähnte Fauna aufnehmen zu können, was mir um so mehr zum Bedürfnisse gereichte, da das gewesene entomologische Kabinet des verstorbenen *Eschscholtz* durch Kauf ein Eigenthum der Moskauer Universität geworden war. Die freundschaftliche Gefälligkeit, womit diese Herren meine Wünsche hierin befriedigten, ist über alles Lob erhaben und die Beiträge, die ich dadurch erhielt, gehören ge-

wiss zu den interessantesten bei der Vervollständigung meines beabsichtigten Werkes ; insbesondere waren einige von Herrn Ménétriés mitgetheilte Käfer ausgezeichnet , die der vormalige Gouverneur der russisch-amerikanischen Colonien , S<sup>r</sup> Excellenz Herr Contre-Admiral *F. Wrangel* , dieser jedem Verehrer der Wissenschaften wohlbekannte Mann , aus Californien mitgebracht und dem Museum der Akademie überlassen hatte. Schliesslich muss ich noch der Güte des Herrn *Johannes Oberts*, eines jungen hoffnungsvollen Entomologen, erwähnen, mir einige vom Dr. *Blaschke* gesammelten Käfer aus Sitkha und Californien verabfolgt zu haben.

Da aber Herr *Ferdinand Sahlberg* , Doctor der Medicin und ein würdiger Sohn des berühmten Entomologen, Herrn Professor Sahlbergs, im Jahre 1839 den gegenwärtigen Gouverneur der Besitzungen der russisch-amerikanischen Compagnie , Flott-Capitain ersten Ranges *Etholén* , dem ich schon längst eine in der Umgegend von Jakutsk von ihm selbst gemachte Sammlung Käfer verdanke, auf seiner Reise nach Brasilien , Chili und Sitkha begleitete und im Verlaufe dieses Winters nach der Heinath zurückzuerwarten war , entschloss ich mich, meiner vor etwa einem Jahre schon begonnenen Arbeit Einhalt zu thun, und dieses um so lieber , weil Doctor *Sahlberg* sich ein ganzes Jahr auf Sitkha aufgehalten hatte und deshalb von einem so thätigen und wissenschaft-

lich gebildeten Sammler recht vieles zu erwarten war. Allein kürzlich wurde von dem Reisegefährten des Herrn *Sahlbergs*, dem Herrn *Wosnesensky*, an die Akademie der Wissenschaften eine beträchtliche Sendung von dem letzgenannten auf Sitkha und in Californien gesammelten Insecten heimgeschickt, und die Akademie ertheilte Herrn Ménétriés den Auftrag darüber einen Catalog mit Diagnosen der neuen Arten auszufertigen.—Durch die nehmliche Gelegenheit bekam S<sup>e</sup> Excellenz Herr *Fischer von Waldheim* eine in denselben Gegenden von einem Zöglinge des Ackerbau-Institutes zu Moskwa, *Tschernikh*, gemachte Käfer-Sammlung, die mir zur Benutzung für mein Werk gefälligst mitgetheilt worden ist. Um nun nicht meine auf die viele schon fertig liegende vollständige Art-Beschreibungen und die Auseinandersetzung der neuen Gattungen angewandte grosse Mühe, durch den bald erscheinenden Catalog des Herrn Ménétriés zum grossen Theile vereitelt zu sehen, finde ich mich jetzt genöthigt einen Prodrromus der von mir begonnenen Käfer-Fauna dem entomologischen Publicum zu überliefern, hauptsächlich in der Absicht um die Priorität der Benennungen der neuen Arten für mich gesichert zu haben.

Durch diese Umstände gezwungen den Druck gegenwärtiger Abhandlung zu beschleunigen, erachte ich es am besten, die im Käfer-Cataloge des

Herrn Grafen *Dejean* (\*) beobachtete systematische Anordnung zu befolgen, obgleich ich das natürliche System für die Aufstellung in der eigentlichen Fauna zu benutzen gesonnen war, wobei ich auch die Absicht hatte, zugleich eine Darstellung der geognostischen und klimatischen Verhältnisse der gedachten Länder, nebst einigen Bemerkungen über die geographische Verbreitung der da-selbst vorkommenden Insecten-Gattungen, als Einleitung zu dem Werke, vorangehen zu lassen. Ich beschränke mich also nur auf die blossen Diagnosen der mir bisher bekannten Species und sollte es mir auch nicht später gelingen, meinen aufgefasten Plan durchzusetzen, so wird es mir doch immer zur Genugthuung gereichen, würdigeren Naturforschern den Weg zu einem vollständigeren Werke über die entomologischen Produkte der mehr erwähnten Länder gebahnt zu haben.

Es enthält also dieser Prodromus Diagnosen von 300 Arten, wovon 148 bisher entweder ganz unbekannt oder in keinem entomologischen Werke beschrieben gewesen sind. Die Species, die ich nicht zur Untersuchung habe bekommen können, und deren Diagnosen aus verschiedenen Schriften und Abhandlungen abgeschrieben oder auch von mir, ohne Ansicht der

(\*) Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le Comte *Dejean*; troisième édition. Paris, 1837. in-8°.

Käfer, ergänzt worden sind, habe ich durch ein  
 \* ausgezeichnet. Von denen im *Dejean'schen Cataloge* angeführten Arten blieben mir doch, ungeachtet alles Strebens sie zur Beschreibung zu erhalten, folgende vierzehn ganz unbekannt, nehmlich aus Californien: DROMIUS CALIFORNICUS *Dej.*, MICROSAURUS CONFUSUS *Dej.*, NOTOXUS ANGUSTATUS *Eschsch.*, NECROPHORUS LATERALIS und AURIPILOSUS *Eschsch.*, SCOTERA GIBBOSA *Eschsch.*, LIXUS CALIFORNICUS *Eschsch.*, AMPHICYRTA DENTIPES *Eschsch.*, HIPPODAMIA 7-LUNATA *Eschsch.*, HYPERASPIS QUADRIOCULATA *Eschsch.*, und RHANIS ANGUSTICOLLIS *Eschsch.*, aus Sitkha: AEGIALITES DEBILIS *Eschsch.*, AGYRTES LATUS *Eschsch.*, und PLECTRURA SPINICAUDA *Eschsch.*, alle diese Arten von *Eschscholtz* dem Grafen *Dejean* mitgetheilt, daher es zu vermuthen ist, dass sie in seiner gewesenen eigenen Sammlung sich befinden müssten.

Wiburg den 28<sup>sten</sup> Februar 1843.

---

## PENTAMERA.

### CARABICI.

- \*1. OMUS CALIFORNICUS *Eschscholtz*: Niger, nitidus, thorace subcylindrico ruguloso, basi apiceque truncato, elytris connatis ovatis, supra sparsim punctato-rugosis, margine inflexo laevi, linea longitudinali rufa brunnea notato.

*Longit. 7 1/2 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. I. p. 4. Tab. IV. fig. 1.- *Laporte*, Annal. Soc. entom. de France I. p. 386. 1., *Reiche*, ibid. VII. p. 301. 3. pl. 10. fig. 3. - *Lacodaire*, Révision de la famille des Cicindélides, p. 16.

Habitat in California ; ad Cabo de los Reyes mense Novembbris sub lapide specimen unicum a D. *Eschscholtz* captum.

- \*2. **AMBLYCHEILA PICOLOMINII Dupont** : Atra, nitida, capite lavigato, thorace subquadrato, lavigato subcanaliculato, elytris obsolete punctulatis, lineis tribus elevatis, interstitiis punctis profunde impressis

*Longit. 13 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 4 lin.*

*Reiche*, Annal. Soc. entom. de France. VIII. p. 560. pl. 19. fig. 1—6.

Habitat in California ad Sinum St. Francisco. D. *Picolominii*.

3. **GALERITA CALIFORNICA** : Nigro-fusca, testaceo pubescens, capitis puncto, antennis, thorace angustiore oblongo-cordato pedibusque rufo-ferrugineis, elytris oblongo-quadratis obscure cyanescentibus, leviter striatis.

*Longit. 6 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 2 $\frac{1}{5}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

*Gal. Jano* Fabr. (*cyanipennis* Dej. Sp.) minor et in thorace et elytris multo angustior.

4. **CYMINDIS VIRIDIS Eschscholtz** : Glabra, viridi-cyanea, thorace cordato, elytris tenue striato-

punctatis, punctisque duobus impressis, tibiis  
tarsisque nigris, antennis basi rufis.

*Dejean*, Species général des coléoptères V. p. 325. 46. Ca-  
talogue des coléoptères 3<sup>me</sup> édit. p. 9.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

5. **DROMIUS NIGRINUS** *Eschscholtz*; Obscure nigro-  
æneus, thorace postice angustato, subcordato,  
elytris obsoletissime striatis, disco impuncta-  
tis, antennis pedibusque piceis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  lin. Latit.  $\frac{2}{3}$  lin.*

*Dejean* Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 11.

Habitat in California D. *Eschscholtz*. Mus. Univ. Imp.  
Mosqv.

Colore *D. truncatello* Auct. similis, sed thorace clytrisque  
multo longior.

- \*6. **LEBIA CYANIPENNIS** *Eschscholtz*: Nigra, elytris  
cyaneis.

*Longit. 2 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 385, 54. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 12.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

7. **BRACHINUS TSCHERNIKHII**: Ferrugineus, thorace  
breviore subcordato, angulis posticis rectis,  
elytris oblongo-quadratis, subcostatis cyaneis,  
pectoris lateribus abdomineque obscuris.

*Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{5}{6}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

*B. conformi* Dej. proximus, sed thorace breviore, angulis  
posticis rectis et elytris longioribus diversus.

8. CYCHRUS ANGUSTICOLLIS *Eschscholtz*: Elongatus, niger, thorace angusto, cordato, elytris obscure violaceo-brunneis, utrinque carinatis, dorso obsolete trilineatis, margine obscure viridi-aeneo.

*Longit. 8, 9<sup>1/2</sup> lin. Latit. 3<sup>1/4</sup>, 3<sup>5/4</sup> lin.*

*Fischer*, Entomogr. de la Russie II. p. 46. 4. Tab. 46. fig. 2. III. p. 142. 6. — *Dejean*, Spec. gén. V. p. 526. 10. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 20.

Habitat in insula Unalaschka *D. Langsdorff*; in insula Sitkha sat frequens *DD. Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*; in truncis putridis et sub muscis viciat.

9. CYCHRUS MARCINATUS *Eschscholtz*: Niger, thorace cordato, elytris utrinque carinatis, curreo-aeneis, granulato-striatis, margine viridi-aureo.

*Longit. 6, 6<sup>1/2</sup> lin. Latit. 2<sup>1/2</sup>, 2<sup>5/4</sup> lin.*

*Fischer*, Entomogr. I. p. 79. Tab. 7. fig. 1. III. p. 142. 5.—*Eschscholtz* Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 98. 2.—*Germar* Coleopt. spec. nov. p. 3. 5.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 12. 8. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 20.

Habitat in insula Unalaschka, vere sub lapidibus et in rupium fissuris, inter muscos singulatim, *D. Eschscholtz*; in insula Sitkha frequentius, *DD. Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*, in truncis putridis et sub muscis degens.

10. CYCHRUS VENTRICOSUS *Eschscholtz*: Niger, thorace cordato, postice coarctato, elytris ovatis valde convexis, utrinque carinatis, dense striatis, striis profunde punctatis.

*Longit. 8. lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 527. 11. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 20.—  
*Eschscholtz* Zool. Atlas. V. p. 21. 1. Tab. XXV. fig. 1.

Habitat in California ad St. Franzisco. *DD. Eschscholtz et Blaschke.*

11. **CARABUS CHAMISSONIS** *Eschscholtz* : Ovatus, niger, thorace quadrato, postice truncato, elytris subreticulatis, elevato-striatis, striis interruptis, punctisque obsoletis oblongis elevatis triplici serie.

*Longit. 6 $\frac{3}{4}$ , 7 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 2 $\frac{3}{4}$ , 3 lin.*

*Fischer*, Entomogr. I. p. 88. 12. Tab. 7 fig. 12. III. p. 220. 87.—*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 100. 4.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 161. 102. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 24.

**C. BRACHYDERUS** *Wiedemann* in *Germar Mag.* IV. p. 110. 5.  
Habitat in insula Unalaschka frequens vere sub lapidibus  
ad littora lacuum. *D. Eschscholtz.*

12. **CARABUS BACCIVORUS** *Eschscholtz* : Oblongo-ovatus, niger, thorace angustato, quadrato, subrugoso, elytris crenato-striatis, interstitiis saepe interruptis, punctisque impressis triplici serie.

*Var. b. elytris brunneo-testaceis.*

*Var. c. punctis excavatis in elytrorum basi  
deficientibus et seriebus versus apicem saepe  
punctis vagis intermixtis.*

*Longit. 8 $\frac{1}{2}$ , 9 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$ , 3 $\frac{3}{4}$  lin.*

*Fischer*, Entomogr. I. p. 87. 11. Tab. 7. fig. 11. III. p. 221. 89.—*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 99. 3.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 167. 107. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 24.

C. *SERIATUS* *Wiedemann* in *Germar*, Mag. IV. p. 109. 4.

Habitat in insula Unalaschka frequens per totam aestatem; rapina deficiente flores PRIMULÆ CUNEIFOLIÆ *Ledeb.* depascens, et autumno baccis EMPETRI NIGRI vitam sustentans. D. *Eschscholtz*.

\*13. *CALOSOMA CANCELLOMORPHUM* *Eschscholtz*: thorace brevissimo, scabro, aeneo, angulis posticis productis, elytris viridi-aeneis, obsoletè striatis, rugis brevissimis transversis irregularibus, punctisque oblongis elevatis triplici serie, tibiis intermediis rectis.

*Longit. 9. lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atl. V. p. 23. 4.

Habitat in California ad S<sup>t</sup>. Franzisco. D. *Eschscholtz*.

14. *LEISTUS FERRUGINOSUS* (\*): Rufo ferrugineus, thorace cordato, angulis anticis prominulis, elytris dorso profunde striatis, striis tenui-

(\*) Nachdem *Germar* in seiner vortrefflichen Zeitschrift für die Entomologie 2<sup>te</sup> B. p. 442. erwiesen hat, dass der Name *ferrugineus* dem *Leistus spinilabris* Fabr. zukommen müsste, habe ich es als unumgänglich erachtet die Benennung der hier fraglichen Art zu ändern.—Was *Germar* zugleich in Betreff des jezigen *Harpalus ferrugineus* sagt, muss ich bestreiten, denn ich habe selbst einige Stücke dieses ächten *Harpalus* im südlichen Schweden gefangen.

ter punctatis, tertia foveolis quatuor impressis.

*Longit. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin.*

LEISTUS FERRUGINEUS *Eschscholtz*, *Dejean*. Spec. gén. V. p. 569. 9. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 25. — *Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 24. 9. Tab. XXV. fig. 4.

Habitat in insula Sitkha in truncis putridis *DD.* *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

15. NEBRIA METALLICA *Eschscholtz*: Nigra, elytris cupreo-violaceis, striato-punctatis, interstitiis alternatim interruptis.

*Var. b.* elytris aureo-micantibus.

*Longit. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 6 lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Fischer*, Entomogr. I. p. 71. 1. Tab. 6. fig. 1. III. p. 245. 3.—*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 100. 5.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 229. 7. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 25.

Habitant in insula Unalaschka, vere frequentissima, turbatim sub lapidibus in rupium vicinitate. *D.* *Eschscholtz*; in insula Sitkha ad rivulos e montibus defluentes. *DD.* *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

- \*16. NEBRIA GEBLERI *Eschscholtz*: Nigra, elytris cupreo-violaceis, striatis, striis obsolete punctatis, interstitiis tertio et septimo sub-interruptis.

*Longit. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 6. lin. Latit. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 2. lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 573. 36. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 25.—*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 23. 5. Tab. XXV. fig. 3. Habitat in insula Sitkha æstate sub lapidibus ad rivulas nivas in montium vicinitate rarius *D.* *Eschscholtz*.

17. NEBRIA GREGARIA *Eschscholtz*: Elongata, nigra, elytris nigro-aeneis, striatis, striis simplicibus, tertia quadripunctata, antennis pedibusque piceis.

*Var. b.* antennis pedibusque totis cum elytrorum margine inflexo rufo-piceis.

*Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.*

*Fischer*, Entomogr. I. p. 72. 2. Tab. 6. fig. 2 III. p. 250.

10.—*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. des natur. de Moscou VI. p. 101. 6.—*Dejean*, Spec. gén. II. p. 232. 10. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 25.

Habitat in insula Unalaschka, vere sub lapidibus ad littora maris frequentissima. *D. Eschscholtz*.

18. NEBRIA MANNERHEIMII *Eschscholtz*: Nigra, elytris oblongo-ovatis, striatis, striis obsolete punctatis, punctisque quinque vel sex impressis, antennis pedibusque piceis.

*Longit. 4 $\frac{1}{2}$ , 5 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$ , 2 lin.*

*Fischer*, Entomogr. III, p. 253. 14. Tab. 14. fig. 5.—*Dejean*, Spec. gén. V. p. 575. 38. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 25.—*Eschscholtz*, Zool. Atlas V. p. 23. 6.

Habitat in insula Sithka ad rivulas *D. Eschscholtz*.

19. NEBRIA SAHLBERGII *Eschscholtz*: Nigra, elytris oblongis, striato-punctatis, stria tertia punctis quinque impressis, antennis tarsisque rufo-piceis.

*Var. b. Supra violaceo-micans.*

*Longit. 3 $\frac{3}{4}$ , 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ , 1 $\frac{3}{4}$  lin.*  
N° II. 1843.

*Fischer*, Entomogr. III. p. 254. 16. Tab. 14. fig. 2. — *Dejean*, Spec. gén. V. p. 576, 39. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 25. — *Eschscholtz*, Zool. Altas. V. p. 23. 7.

Habitat in insula Sitkha cum præcedente *D. Eschscholtz*; a *DD. Kuprianoff* et *Blaschke*, etiam missa, quamvis nullum præcedentis speciei individuum communicaverunt.

20. *PELOPHILA Eschscholtzii Sturm*: Nigra-ænea, thorace antice elytrorum basi latitudine æquali, elytris evidenter punctato-striatis, limbo viridi-æneo.

*Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.*

*Mannerheim* in *Hummel*, Essais entom., III. p. 40. 4. — *Fischer*, Entomogr. III. p. 260.

*NEBRIA Eschscholtzii Sturm* Catalog. p. 173.

Habitat in insula Unalashka sub lapidibus. *D. Eschscholtz*.

21. *ELAPHRUS CALIFORNICUS*: Supra obscure æneus, punctatissimus, thorace capitis fere latitudine, sub foveolato, elytris costis subelevatis interruptis, maculisque obscuris ocellatis impressis quadruplici serie; subtus viridi-æneus, femorum basi tibiisque ferrugineis.

*Longit. 3 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California *D. Tschernikh*

*E. Americano Dej.* paullo major, capite thoraceque multo latioribus, hoc obsolete tantum foveolato diversus.

- \*22. *NOTIOPHILUS SYLVATICUS Eschscholtz*: Elongatus, supra cupreo-æneus, fronte quinque sulcata, elytris vitta dorsali flava, striisque sex

dorsalibus remotis, prima dorsali apice fere recta, foveolaque antica impressa.

*Longit. 2<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 24. 10. Tab. XXV. fig. 5.

*N. BIGUTTATUS* Var. *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 27.

Habitat in insula Sitkha sylvis *D. Eschscholtz*.

\*23. *NOTIOPHILUS SEMIOPACUS* *Eschscholtz*: Supra æneus, fronte multistriata, thorace subquadrato, elytris, sutura, vittaque dorsali tenuiter striata, bifoveolata et apice flavescenti-opacis.

*Longit. 2<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 25. Tab. XXV. fig. 6.

Habitat in California ad S<sup>t</sup>. Francisco. *D. Eschscholtz*.

24. *METRIUS CONTRACTUS* *Eschscholtz*: Niger, thorace quadrato, lateribus late reflexo-marginatis, elytris connatis, ovatis, convexis, obsolete striato-punctatis, pedibus nigro-piceis.

*Longit. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. I. p. 8. Tab. 1. fig. 4. — *Dejean*, Spec. gén. V. p. 591. 1. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 27.

Habitat in California, sub lapidibus et truncis putridis arborum *D. Eschscholtz*.

\*25. *LORICERA SEMIPUNCTATA* *Eschscholtz*: Nigropicea, thorace basi parum angustato; angulis basalibus productis, elytrorum striis tenuiter punctulatis, disco tri-foveolato.

*Longit. 3<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 25. 12.

Habitat in California ad S<sup>t</sup>. Francisco. *D. Eschscholtz*.

26. **LORICERA DECEMPUNCTATA** *Eschscholtz*: Nigro-aenea, thorace basi subito angustato, angulis rectis productis, elytris punctato-striatis, foveolis quinque, serie interna tribus, externa duabus.

*Longit. 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 1<sup>4</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 25. 13. Tab. XXV. fig. 7.

Habitat in insula Sitkha *DD. Eschscholtz, Kuprianoff et Blaschke*.

- \*27. **CHLÄNIUS VIRIDIFRONS** *Eschscholtz*: Capite violaceo, fronte viridi, occipite profunde punctato, thorace violaceo, basi coarctato, dense profunde punctato, elytris nigris, obsolete striatis, antennis pedibusque flavo-ferrugineis.

*Longit. 7 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 27. 16.

Habitat in California ad S<sup>t</sup>. Francisco *D. Eschscholtz*.

- \*28. **CHLÄNIUS VARIABILIPES** *Eschscholtz*: Niger, pubescens, capite laevi, thorace subviolaceo, punctatissimo, basi coarctato, angulis productis, elytris obsolete punctulatis, striis profunde punctatis, antennarum basi pedibusque aut rufo-testaceis, aut nigris.

*Longit. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Altas. V. p. 27. 17.

Habitat in California ad S<sup>t</sup>. Francisco *D. Eschscholtz*.

- \*29. **CHLÄNIUS HARPALINUS** *Eschscholtz*: Capite thoraceque nigro-æneis, nitidis, subviridibus, thorace brevi antice rotundato, medio punctis singulis majoribus impressis, basi in fossis et angulis rudepunctato, elytris nigro-subviridi- bus opacis, subtilissime striatis.

*Longit. 5 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Altas. V. p. 27. 18.

Habitat in California ad S<sup>t</sup>. Franzisco. *D. Eschscholtz*.

30. **CHLÄNIUS VICINUS** *Dejean*: Nigro-piceus, supra pubescens, capite sublævi thoraceque quadrato punctatissimo, viridi-æneis, elytris obscurioribus, striato-punctatis, interstitiis subtilissime granulatis, antennarum basi pedibusque testaceis.

*Longit. 4 $\frac{3}{4}$  lin. Latit. 2 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 659. 108. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 29.

**C. PUBESCENS** *Harris*.

Habitat in California *D. Tschernikh.*

Ab individuis Americanis differt elytrorum interstitiis - multo subtilius granulatis; ceterum in omni puncto illis simillimus, quare ut species diversa ægre dijudicandus.

31. **BADISTER FERRUGINEUS** *Eschscholtz*: Capite scutelloque nigris, thorace capite latiore rufopiceo, ferrugineo-marginato, elytris fuscis cyaneo-micantibus, margine omni tenue, anno, antennarum basi pedibusque ferrugineis.

*Longit. 2 $\frac{2}{3}$ , 3 lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 690. 6. Cat. 3<sup>me</sup> édit, p. 31.

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. V. p. 28, 20.

Habitat in California ad St. Francisco. *D. Eschscholtz*.

32. PATROBUS FOVEOCOLLIS *Eschscholtz*: Apterus, nigro-piceus, thorace subcordato, postice utrinque foveolato, elytris oblongo-ovatis, subconvexis, punctato-striatis, punctisque quatuor impressis, pedibus rufo-piceis.

Longit.  $4\frac{1}{4}$ ,  $4\frac{3}{4}$  lin. Latit.  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 30. 4. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 32.

PLATYSMA FOVEOCOLLIS, *Eschscholtz*. Mém. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou VI. p. 105. 19.—*Fischer*, Entomogr. II. p. 129. 2. Tab. 19. fig. 5.

Habitat in insula Unalaschka, sub lapidibus frequens *D. Eschscholtz*.

33. PATROBUS FOSSIFRONS *Eschscholtz*: Apterus, nigro-piceus, thorace subtransverso, subcordato, postice utrinque foveolato, elytris oblongo-ovatis, punctato-striatis, punctisque tribus impressis, pedibus piceis.

Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 31. 5. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 32.

PLATYSMA FOSSIFRONS, *Eschscholtz* Mém. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou VI. p. 104. 9.—*Fischer*, Entomogr. II. p. 128. I. Tab. 19. fig. 4.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus et in Kamtschatka etiam occurrit, *D. Eschscholtz*.

34. PATROBUS ATERRIMUS *Eschscholtz*: Alatus niger, depresso, thorace subcordato, postice

transversim impresso, elytris elongatis, subparallelis, striatis, punctisque tribus impressis.

*Longit. 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 32. 6. Cat. 3<sup>me</sup> édit, p. 32.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianooff* et *Blaschke*.

35. **CALATHUS INGRATUS Eschscholtz**: Apterus nigropiceus, thorace brevi, subquadrato, leviter convexo, margine rufescente, angulis posticis subrotundatis, elytris oblongo-ovatis, parum convexis striatis, punctisque tribus impressis, antennis pedibusque pallide testaceis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$ , 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ , 1 $\frac{3}{4}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 77. 14. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 33.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

36. **CALATHUS RUFICOLLIS Eschscholtz**: Apterus, fusco-piceus, thorace obscure rufo, quadrato depresso, antice subangustato, angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis subtiliter striatis, punctisque tribus impressis, antennis pedibusque pallide testaceis.

*Longit. 3 $\frac{3}{4}$ , 4 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 $\frac{2}{5}$ , 2 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 78. 15. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 33.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh*:

37. **CALATHUS BEHRENSII**: Apterus, fusco-piceus, capite thoraceque brunneo-piceis, thorace quadrato subdepresso, antice vix angustato;

angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis opacis, subtiliter striatis, punctisque tribus impressis, antennis pedibusque ferrugineis.

*Longit. 4 lin. Latit. 2 $\frac{1}{4}$  lin.*

Habitat in California ad Ross D. Dr. Fischer,

Præcedenti valde similis et affinis, sed brevior, multo, præsertim in thorace, latior et colore capitis thôracisque obscurior.

38. ANCHOMENUS OVIPENNIS *Eschscholtz*: Apterous niger, subdepressus, thorace cordato, marginato, angulis posticis obtusis, elytris ovalibus apice sinuatis, profunde striatis, punctis tribus minutis impressis.

*Longit. 6 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$  lin.*

Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 34.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh*; a DD. *Fischer de Waldheim* et *Obert* ad describendum benevole communicatus.

39. ANCHOMENUS RUGICEPS: Apterous, niger subdepressus, capite inæquali rugoso, thorace brevi marginato, posterius angustato, angulis posticis rectis, elytris oblongo-ovalibus, apice sinuatis, leviter striatis, punctis tribus minutis impressis, antennis pedibusque piceis.

*Longit. 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh*.

40. ANCHOMENUS BRUNNEOMARGINATUS: Apterous, niger, depresso, capite lævissimo inter anten-

nas impresso, thorace longiore, subcordato, lateribus reflexo-marginatis, angulis posticis acutiusculis, elytris oblongo-ovalibus, apice sinuatis, leviter striatis, punctis tribus minutis impressis, antennis, pedibus, thoracis elytrorumque margine rufo-brunneis.

*Longit. 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{5}{4}$  lin.*

Habitat in California. D. Tschernikh.

41. ANCHOMENUS CALIFORNICUS *Eschscholtz*: Alatus, capite, thoraceque obscure viridi-æneis, thorace subquadrato, elytris nigro-æneis, oblongo-ovatis, subtilissime striato-punctatis, punctisque quinque impressis, antennis pedibusque piceis.

*Longit. 3 $\frac{1}{4}$ , 3 $\frac{3}{4}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$ , 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 127. 23. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 35.

AGONUM CALIFORNICUM *Eschscholtz* in litteris.

AGONUM LEPIDUM *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

42. ANCHOMENUS FERRUGINOSUS *Eschscholtz*: Alatus, piceus, æneo-micans, thorace oblongo-ovato, elytris, oblongo-ovatis, obsolete striato-punctatis, punctisque quatuor impressis pedibus rufo-pallidis.

*Longit. 3 lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 128. 24. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 35.

AGONUM FERRUGINOSUM *Eschscholtz* in litteris.

43. ANCHOMENUS MOLLIS *Eschscholtz*: Alatus, ovatus, nigro-piceus, thorace ovato, subquadrato, angulis posticis subrotundatis, elytris oblongo-ovatis, subtiliter striatis punctisque duobus impressis, antennis pedibusque rufo-piceis.

*Longit. 4 $\frac{1}{2}$ , 5 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$ , 2 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 129. 25. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 35.

AGONUM MOLLE *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou VI. p. 102. 7.—*Fischer Entomogr.* II. p. 125. 1. Tab. 19. fig. 2.

Habitat in insula Unalaschka sat frequens sub lapidibus D. *Eschscholtz*.

44. ANCHOMENUS SULCATUS *Eschscholtz*: Apterous, ovatus, nigro-piceus, thorace subquadrato, postice utrinque impresso, margine subreflexo, angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis, striatis, punctisque quatuor impressis, antennis pedibusque rufo-piceis.

*Longit. 4, 5 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ , 2 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 131. 26. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 35.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

45. ANCHOMENUS STRIATUS *Eschscholtz*: Apterous, ovatus, nigro-piceus, thorace quadrato, angulis posticis subrotundatis, elytris ovatis subtiliter striatis, punctisque quinque impressis, antennis pedibusque rufo-piceis.

*Longit. 3 $\frac{3}{4}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 132. 27. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 35.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

46. ANCHOMENUS MACULICOLLIS *Eschscholtz*: Apterous, nigro-piceus, ovatus, thorace elytrisque margine late ferrugineo, elytris ovatis, subtiliter striatis, interstitiis obsolete punctulatis, punctisque distinctis sex impressis, antennis pedibusque pallide testaceis.

*Longit. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 2 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 175. 48. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 36.

*CULÄNIUS MACULICOLLIS* *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

47. ANCHOMENUS BREVICOLLIS *Eschscholtz*: Apterus, ovalis, niger, thorace breviore, subquadrato, subtransverso, elytris subparallelis, brevioribus, subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, punctisque quatuor impressis.

*Longit. 4 lin. Latit. 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 159. 30. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 36.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

\*48. ANCHOMENUS FOSSIGER *Eschscholtz*: Niger, thorace oblongo-ovato, elytris elongatis subparallelis, subtiliter striatis, striis obsolete punctatis, punctisque quinque impressis.

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 160. 31. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 36.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

49. PTEROSTICHUS CALIFORNICUS *Eschscholtz*: Apterous, niger, thorace subcordato, postice utrin-

que striato, elytris oblongo-ovatis, subparallelis striatis.

*Longit. 5 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{4}$  lin.*

FERONIA (POECILUS) CALIFORNICA Dejean, Spec. gén. III. p. 222, 14. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 38.

POECILUS CALIFORNICUS Eschscholtz in litteris.

BRACHYSTYLUS CALIFORNICUS Chaudoir, Bullet. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou 1838. p. 17.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Blaschke.

50. PTEROSTICHUS VICINUS : Apterous, niger, thorace cordato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis parallelis, striatis, antennis palpisque brunneo-rufis.

*Longit. 5 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$  lin.*

Habitat in California DD. Blaschke et Tschernikh.

Præcedenti affinis, sed minor, angustior, thorace antice, latiore, magis cordato, elytrisque thorace angustioribus lateribus omnino parallelis, subtilius striatis diversus.

- \*51. PTEROSTICHUS OCCIDENTALIS Dejean: Alatus, depresso, supra nigro-cyanus, thorace lævi, cordato, postice utrinque striato, elytris subparallelis, striatis, punctisque duobus postice impressis, antennarum articulis tribus primis rufis.

*Longit. 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$  lin.*

FERONIA (POECILUS) OCCIDENTALIS, Dejean, Spec. gén. III. p. 231, 23. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 38.

POECILUS DEPRESSUS Eschscholtz in litteris.

Habitat in California D. Eschscholtz.

52. PTEROSTICHUS HERCULANEUS: Apterous, niger, thorace anterius parum latiore, depresso, postice utrinque profunde bistriato, elytris ovatis, subparallelis, profunde striatis, humeris denticulatis, apice obtuse rotundatis.

*Longit. 8 lin. Latit. 3 lin.*

Habitat in insula Sithka; a D. Obert ad describendum benevolē communicatus.

Sequenti affinis, sed multo major, magis depresso, thorace longiore utrinque profunde bistriato et aliis notis distinctus.

53. PTEROSTICHUS VALIDUS *Eschscholtz*. Apterous, niger, thorace subcordato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, subparallelis, profunde striatis.

*Longit. 5<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 6 lin. Latit. 2, 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

FERONIA (PLATYSMA) VALIDA, *Dejean*, Spec. gén. III. p. 325.  
116. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

POECILUS VALIDUS, *Eschscholtz* in litteris.

BRACHYSTYLUS VALIDUS, *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 17.

Habitat in insula Sitkha sat frequens; DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff*, *Blaschke* et *Tschernikh*.

54. PTEROSTICHUS AMETHYSTINUS *Eschscholtz*: Apterous, nigro-piceus, nitidus, subdepresso, thorace subquadrato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, subparallelis, profunde striatis, violaceis, antennis pedibusque piceo-ferrugineis.

*Longit. 5, 6<sup>1/2</sup> lin. Latit. 1<sup>2/3</sup>, 2<sup>1/3</sup> lin.*

FERONIA (PLATYSMA) AMETHYSTINA, *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

HYPHERPES AMETHYSTINUS *Eschscholtz*, *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou 1838. p. 13.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

Præcedenti nonnihil affinis, sed magis, præsertim in elytris, depresso, thorace longiore magis cordato et colore diversus.

55. PTEROSTICHUS CASTANEUS *Eschscholtz*: Apterous, nigro-piceus, thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, striatis, antennis, tibiis tarsisque rufo-piceis.

*Longit. 4<sup>1/2</sup>, 5 lin. Latit. 1<sup>5/4</sup>, 2 lin.*

FERONIA (PLATYSMA) CASTANEA *Dejean*, Spec. gén. III. p. 326. 117. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

HYPHERPES CASTANEUS *Eschscholtz*, *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 13.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

56. PTEROSTICHUS BRUNNEUS *Eschscholtz*: Apterous, nigro-piceus, thorace longiore, subquadrato, postice subangustato, utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, striatis, antennis pedibusque rufo-piceis.

*Longit. 4<sup>1/2</sup> lin. Latit. 1<sup>2/3</sup> lin.*

FERONIA (PLATYSMA) BRUNNEA *Dejean*, Spec. gén. III. p. 32. 118. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

HYPHERPES BRUNNEUS *Eschscholtz*, *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1832. p. 13.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*, in California haud occurrit, ut allegavit illustris. Comes Dejean.

57. **PTEROSTICHUS ANGUSTUS** *Eschscholtz*: Apterus, nigro-piceus. thorace elongato, subquadrato, postice sub-angustato, utrinque striato, elytris elongatis, parallelis, striatis, antennis pedibusque rufo-piceis.

*Longit. 3<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 1<sup>4</sup>/<sub>3</sub> lin.*

**FERONIA** (**PLATYSMA**) **ANGUSTA** *Dejean*, Spec. gén. III. p. 328.  
119. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

**ARGUTOR ANGUSTUS** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

- \*58. **PTEROSTICHUS FUSCO-ÆNEUS** *Eschscholtz*: Totus fusco-æneus, capite obscuriore, thorace sub-transverso, posterius subito angustato, angulis acutis, utrinque profunde bifoveolato, elytris profunde striatis, interstitio tertio posterius punctis tribus impressis.

*Langit. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

**OMASEUS FUSCO-ÆNEUS** *Chaudoir*, Annales de la Soc. entom. de France, IV. p. 448. 20.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

59. **PTEROSTICHUS ADSTRICTUS** *Eschscholtz*: Alatus, niger, thorace subquadrato, postice sub-angustato, utrinque striato, elytris brevioribus, oblongo-ovatis, striatis, striis obsolete punctatis, foveolisque quinque impressis.

*Longit. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>5</sup>/<sub>4</sub>, 2 lin.*

*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, VI. p. 103. 8. — *Fischer*, Entomogr. II. p. 120. 1. Tab. 19. fig. 1.

*Poecilus adstrictus Germar*, Col. sp. nov. p. 47. 27.

*Feronia (Platysma) adstricta Dejean*, Spec. gén. III. p. 319. 110. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

*Bothriopterus adstrictus Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 14.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus passim D. *Eschscholtz*; etiam in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

60. *PTEROSTICHUS SERIEPUNCTATUS*: Alatus niger, nitidus, thorace subquadrato, postice parum angustato, angulis obtusis, utrinque profunde striato, elytris oblongo-ovatis, subtiliter punctato-striatis, foveolis quinque, omnibus in stria tertia impressis.

*Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

Magnitudo et statura præcedentis, sed thorace angustiore, lateribus magis rotundato et foveolis elytrorum omnibus in stria tertia impressis distinctus.

61. *PTEROSTICHUS VENTRICOSUS Eschscholtz*: Apterous, supra æneus, thorace breviore, subquadrato, postice angustato, utrinque striato, elytris ovatis, convexis, striatis, striis subtiliter punctatis, punctisque quatuor impressis, antennis niger, pedibus piceis.

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 2 lin.*

**POECILUS VENTRICOSUS** *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou, VI. p. 106. 11 — *Fischer* Entomogr. II. p. 132. 1. Tab. 19. fig. 6.

**FERONIA (PLATYSMA) VENTRICOSA** *Dejean*, Spec. gén. III. p. 329. 120. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

**CRYOBius VENTRICOSUS** *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838 p. 18.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus frequens D. *Eschscholtz*.

**62. PTEROSTICHUS PINCUEDINEUS** *Eschscholtz* : Apterous, nigro-aeneus, thorace, subcordato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, subconvexis, subtiliter striato-punctatis, punctisque tribus impressis, pedibus rufis.

*Longit. 4, 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ , 1 $\frac{2}{3}$  lin.*

**POECILUS PINGUEDINEUS**, *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, VI. 106. 12. — *Fischer*, Entomogr. II. p. 133. Tab. 19. fig. 7.

**FERONIA (PLATYSMA) PINGUEDINEA** *Dejean*, Spec. gén. III. p. 330. 121. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

**CRYOBius PINGUEDINEUS** *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 18.

Habitat in insula Unalaschka sub lapidibus passim D. *Eschscholtz*.

**13. PTEROSTICHUS EMPETRICOLA** *Eschscholtz* : Apterous, nigro-aeneus, thorace cordato, postice utrinque striato, elytris oblongo-ovatis, subtiliter striato punctatis, punctisque quatuor impressis, antennarum basi pedibusque rufis.

*Longit. 3 $\frac{1}{4}$ , 3 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$ , 1 $\frac{1}{3}$  lin.*

**FERONIA (PLATYSMA) EMPETRICOLA** *Dejean*, Spec. gén. III. p. 331. 122. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

**ANCHOMENUS LATICOLLIS** *Sturm*, Cat. p. 91.

**CRYPTOBIAUS EMPETRICOLA** *Chaudoir*, Bullet. de la Soc. Imp. des nat. de Moscou, 1838. p. 18.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

64. **PTEROSTICHUS RIPARIUS** *Eschscholtz*: Apterous, nigro-aeneus, thorace breviore cordato, postice utrinque bistriato, elytris oblongo-ovatis subtiliter striato-punctatis, punctisque duobus vel tribus impressis, antennarum basi pedibusque rufis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

**FERONIA (PLATYSMA) RIPARIA** *Dejean*, Spec. gén. III. p. 332. 123. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 40.

**MOLOPS RIPARIUS** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

65. **PTEROSTICHUS ATER** *Dejean*: Apterous, niger, thorace cordato, postice utrinque bistriato, elytris subparallelis, subtiliter striatis, striis, obsolete punctatis.

*Longit. 9 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3 $\frac{1}{2}$  lin.*

**FERONIA (PTEROSTICHUS) ATRA** *Dejean*, Spec. gén. III. p. 332. 129. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 41.

**PLATYSMA ATERRIMUM** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Wrangel*, specimen e Museo Acad. Imp. Scient. Petrop. ad examinandum benevole communicavit D. *Ménétriés*.

66. AMARA LITTORALIS *Eschscholtz*: Oblongo-ovata, obscure ænea, subtiliter punctulata, thorace antice angustato, postice utrinque obsolete bisevoeolato, foveis punctulatis, elytris striatis, in striis vix punctulatis, antennarum articulis tribus baseos ferrugineis, tibiis tarsisque piceis.

*Longit. 3, 3<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin.*

Zimmermann, in *Gistl Faunus I.* 1. p. 35. in *Silbermann Revue entom. II.* p. 227.

A. PLEBEJA VAR. *Dejean*, Spec. gén. III. p. 467. 7. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 44

A. PUNCTULATA *Dejean*, Spec. gén. III. p. 472. 14. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 44 (\*).

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff*, *Blaschke* et *Tschernikh.*

67. AMARA SCITULA *Zimmermann*: Oblongo-ovata, subtiliter punctulata, supra obscure ænea, subtus nigro-virescens, thorace anterius angustato, apice emarginato, lateribus non de-

(\*) *Dejean* hat die A. LITTORALIS *Eschsch.* mit seinem A. PLEBEJA und PUNCTULATA vereinigt, allein nach *Zimmermann* (*Gistl Faunus I.* 1. p. 24.) ist diese zuletzt genannte eine Varietät der von LITTORALIS sehr verschiedenen CELIA ERRATICA *Duftschmid*. Die Amaroiden meiner Sammlung wurden alle vor einigen Jahren von *Zimmermann* untersucht und benannt, und es befanden sich darunter sowohl die PUNCTULATA aus Kamschatka als die in Sitkha vorkommende LITTORALIS.

planatis, basi utrinque bifoveolato, foveis punctatis, externa obsoleta, elytris leviter striatis, striis anterius punctulatis, pectore confertim punctato, antennarum articulis tribus baseos ferrugineis, tibiis tarsisque rufo-piceis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Zimmermann in *Gistl Faunus* I. 1. p. 32., in *Silbermann Revue entom.* II. p. 223.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

68. AMARA INSIGNIS *Eschscholtz*: Ovata, convexa, supra obscure ænea, thorace subquadrato, antice subangustato, dorso lævi nitido, postice utrinque bifoveolato, foveis punctatis, elytris, striatis, striis impunctatis, interstitiis subtilissime punctulatis, antennis tibiis tarsisque rufis.

*Var. b. supra obscure cyanea.*

*Longit. 4 $\frac{1}{4}$ , 4 $\frac{3}{4}$  lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{3}$  lin.*

Dejean, Spec. gén. V. p. 796. 71. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 45. — Zimmermann in *Gistl Faunus* I. 1. p. 37. in *Silbermann Revue entom.* II. p. 228.

Habitat in California DD. *Eschscholtz et Blaschke*.

69. AMARA REMOTE STRIATA *Eschscholtz*: Subovata, supra obscure ænea, thorace brevi, antice subangustato, basi utrinque bifoveolato, foveis punctatis, elytris levissime striatis, striis remotis, obsolete punctatis, interstutiis subtilissime punctulatis, pectore distincte punctato, antennis, tibiis tarsisque rufo-piceis.

*Var. b.* elytrorum margine inflexo, thorace subtus, pectore abdominis apice, antennis pedibusque pallide ferrugineis.

*Longit.*  $3\frac{1}{5}$ ,  $3\frac{5}{4}$  lin. *Latit.*  $1\frac{1}{2}$ ,  $1\frac{3}{4}$  lin.

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 473. 15. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 44.

A. REMOTA *Eschscholtz*, *Sturm*, Cat. p. 91.

CELIA REMOTA *Zimmermann*, in *Gistl*. Faunus I. t. p. 27. in *Silbermann* Revue entom. II. p. 216.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*; Var. b. e Kamschatka a D. Dr. *Kyber* allata.

70. AMARA CALIFORNICA *Dejean*: Oblongo-ovata, supra obscure ænea, subtus nigro-virescens, thorace antice subangustato, postice utrinque obsolete bifoveolato, foveola externa oblique evidentiore, elytris leviter striatis, striis impunctatis, sterno pectorali maris foveola oblonga impresso, antennis, tibiis tarsisque rufo-ferrugineis.

*Longit.* 4,  $4\frac{1}{3}$  lin. *Latit.*  $1\frac{3}{4}$ ,  $1\frac{5}{6}$  lin.

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 474. 16. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 44.

A. IMPUNCTATA *Eschscholtz* in litteris.

CELIA CALIFORNICA *Zimmermann* in *Gistl* Faunus I. t. p. 25. in *Silbermann* Revue entom. II. p. 215.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

71. AMARA AURATA *Eschscholtz*: Oblongo-ovata, supra ænea nitida, subtus nigro-virescens, thorace antice subangustato, postice utrinque bifoveolato, foveis profunde punctulatis, ely-

tris leviter striatis, striis impunctatis, sterno pectorali integro, antennis ano, pedibusque rufo-ferrugineis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3 lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 475. 17. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 44.

*CELIA AURATA* *Zimmermann* in *Gistl* Faunus I. 1. p. 28. in *Silbermann*, Revue entom. p. 218.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tscher-nikh.*

72. *AMARA MELANOGASTRICA* *Eschscholtz*: Oblonga, nigro-picea, supra subnitida, subtus opaca, thorace lateribus rotundatis, postice angustato, utrinque bistriato, antice posticeque punctato, elytris oblongis profunde punctato-striatis, antennis pedibusque rufis.

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5 lin. Latit. 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 2 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. III. p. 519. 59. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 45.

*LEIRUS MELANOGASTRICUS* *Zimmermann* in *Gistl* Faunus I. t. p. 38. in *Silbermann* Revue entom. II. p. 229.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

73. *ERIPUS LÆVISSIMUS* *Eschscholtz*: Niger, nitidus, capite profunde bicanaliculato, mandibulis elongatis porrectis, thorace elongato, posterius angustato, lateribus et postice marginato, clytris ovalibus, obsoletissime striatis, antennis, palpis pedibusque piceis.

*Var. b. rufo-picea, pedibus dilutioribus.*

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Dejean*, Spec. gén. IV. p. 11. 2. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 46.

**STOMIS LÆVISSIMUS** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California rarius D. *Eschscholtz*.

- \*74. **ANISODACTYLUS CALIFORNICUS** *Eschscholtz*. Ni-ger, thorace subquadrato, punctulato, postice angustato, utrinque obsolete foveolato, elytris striatis, interstitio tertio puncto impresso, antennarum articulo primo subtus testaceo.

*Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. IV. p. 148. 12. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 49.

**HARPALUS CALIFORNICUS** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

### I. **DICHEIRUS** *Eschscholtz*.

Mentum dente medio brevi obtuso.

Palpi articulo ultimo subcylindrico.

Femora antica incrassata; tibiæ anticæ spina apicali duplice, interiore lanceolata incurva, intus excavata, interiore minuta.

Tarsi anteriores maris dilatati, subtus setosi, articulo primo triangulari, 2—4 transversis apice emarginatis.

Caput et thorax profunde punctata, interstitiis elytrorum biseriatim punctatis.

75. **DICHEIRUS DILATATUS** *Eschscholtz*: Oblongo-ova-tus, subparallelus, subpubescens nigro-piceus, thorace subquadrato, parcius punctato, postice

angustato, angulis basalibus obtusis subrotundatis, elytris striis profunde exaratis impunctatis, antennis pedibusque rufo-piceis.

*Var. b.* capite thoraceque etiam rufescenti-piceis.

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 4<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>5</sup>/<sub>6</sub> lin.*

HARPALUS (OPHONUS) DILATATUS Dejean, Spec. gén. IV. p 241. 42. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 51.

Habitat in California DD. Eschscholtz, Blaschke et Tschernikh.

76. DICHEIRUS BRUNNEUS Eschscholtz: Oblongus, subparallelus, subpubescens, nigro-piceus, thorace subquadrato, basi parum angustato, angulis posticis obtusis, dorso crebre punctato, elytris striis sat profunde exaratis impunctatis, antennis pedibusque rufis.

*Longit. 3, 4 lin. Latit. 1, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

HARPALUS (OPHONUS) BRUNNEUS Dejean, Spec. gén. IV p. 239 41. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 51.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Tschernikh.

Cum descriptione ill. Dejean exacte convenit, tantum paullo major et thoracis angulis posticis haud rectis, sed postius obtusis dicandis; an igitur species eadem?

77. HARPALUS SOMNULENTUS Eschscholtz: Oblongus, niger, thorace quadrato, postice utrinque foveolato, foveis punctatis, angulis posticis obtusis, elytris striatis, postice subsinuatis, interstitio tertio punto impresso, antennis pedibusque rufis, geniculis nigricantibus.

*Longit. 3<sup>1/2</sup>, 4 lin. Latit. 1<sup>1/5</sup>, 1<sup>2/5</sup> lin.*

*Dejean*, Spec. gén. IV. p. 333. 117. 3<sup>me</sup> édit. p. 52.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

78. HARPALUS CAUTUS *Eschscholtz*: Oblongo-ovatus, niger, thorace quadrato, postice utrinque foveolato, angulis posticis subrotundatis, elytris striatis, apice subsinuatis, interstitio tertio puncto impresso, antennarum basi tarsisque rufis.

*Longit. 4<sup>1/2</sup> lin. Latit. 1<sup>2/5</sup> lin.*

*Dejean*, Spec. gén. IV. 367. 143. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 53.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

79. HARPALUS ALBIONICUS: Oblongo-ovatus, nigropiceus, thorace transverse-quadrato, basi punctulato, vix foveolato, angulis posticis rotundatis, elytris tenue striatis, apice subsinuatis, interstitio tertio puncto impresso, corpore subtus, antennis pedibusque ferrugineis.

*Longit. 4 lin. Latit. 1<sup>2/5</sup> lin.*

Habitat in California ad Ross D. Dr. *Fischer*.

Statura et magnitudo fere præcedentis, sed thorax brevior, basi vix foveolatus, elytra subtilius striata et color alius.

80. HARPALUS NIGRINUS *Eschscholtz*: Oblongus, niger, thorace quadrato, postice utrinque foveolato, angulis posticis rectis, elytris striatis, apice oblique subsinuatis, interstitio tertio

puncto impresso, antennarum articulo primo  
subtus rufo-testaceo.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>5</sub> lin Latit. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Dejean*, Spec. gén. IV. p. 399. 167, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 54.

TRECHUS NIGRINUS *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

\*81. STENOLOPHUS UNICOLOR *Eschscholtz*: Oblongus, supra obscure rufus, capite, pectore, abdomineque nigro-piceis, thorace subovato, posterius subangustato, utrinque subfoveolato, angulis posticis rotundatis, elytris striatis, interstitio tertio puncto impresso, antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. IV. p. 411. 4. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 54.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

82. BRADYCELLUS NITIDUS *Eschscholtz*: Oblongo-ovatus, rufo-testaceus, thorace subquadrato, postice utrinque subfoveolato, foveis obsolete punctatis, angulis basalibus rectis, elytris obsoletissime striato punctatis, striis suturali marginalique lavigatis profunde impressis, thoracis maculis duabus, elytrorumque macula magna oblonga obsolete nigro-subcya-neis, antennarum basi pedibusque pallide testaceis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3 lin. Latit. 1, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

**ACUPALPUS NITIDUS** *Dejean*, Spec. gén. IV. p. 474. 30. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 55.

**STENOLOPHUS NITIDUS** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California DD *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

\*83. **TRECHUS CHALYBEUS** *Sturm*: Apterus, nigropiceus, subciano-micans, thorace subquadrato, postice utrinque foveolato, angulis baseos subrectis, elytris ovatis, striis obsoletissime externis obsoletis, punctisque tribus impressis, antennarum basi pedibusque rufis.

*Longit. 2 lin. Latit. 1 lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 17. 11. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 56.—  
*Sturm*, Cat. p. 203.

Habitat in insula Unalaschka frequens.

84. **LACHNOPHORUS ELEGANTULUS** : Obscure vire-scenti-aeneus, griseo-pilosus, thorace angusto, cordato, angulis baseos obtusis, elytris albidis, depressis ovatis, striis antice profunde punctatis, postice lævigatis, basi et fascia media transversa undulata, brunneo-testaceis, tibiis ferrugineis.

*Longit. 2 lin. Latit. 5/4 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

Palporum articulo tertio apicem versus incrassato ab hoc genere nonnihil recedit, sed ceteris notis ab illo vix separandus; etiam generi **CALYBE** *Laporte* quodammodo adsimilis.

\*85. **BEMBIDIUM INDISTINCTUM** *Eschscholtz*: Supra viridi-aeneum, thorace subquadrato, postice

utrinque bistriato, angulis basalibus rectis, elytris oblongis, tenui punctato-striatis, fasciis undatis macularibus tribus apiceque pallide testaceis, obsoletis, punctisque duobus impressis, antennis basi testaceis, pedibus testaceis æneo-nicantibus.

*Longit. 2 lin. Latit. 3/₄ lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 67. 30. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 57.

*NOTAPHUS INDISTINCTUS* *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

86. *BEMBIDIUM TRANSVERSALE* (\*) *Dejean*: Capite, thoraceque viridi-æneis, thorace subquadrato, postice subangustato, utrinque foveolato, angulis baseos rectis, elytris oblongo-ovatis, testaceis, punctato-striatis, fascia lata sinuata viridi-ænea, punctisque duobus impressis, antennarum basi pedibusque testaceis.

*Longit. 3 lin. Latit. 1 1/₄ lin.*

*Dejean*, Spec. gén. V. p. 110. 66. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 58.

Habitat in California D. *Tschernikh*; specimen ex America boreali occidentali ad ill. Com. *Dejean* misit D. *Leconte*.

87. *BEMBIDIUM PLANIUSCULUM*: Nigro-æneum, supra depresso, thorace subquadrato, postice angustato, utrinque foveolato, bistriato, margine

(\*) Diese und die folgende vier Arten gehören zu der Abtheilung *PERYPHUS*.

viridi-æneo, elytris oblongis deplanatis, profunde striatis, interstitio tertio punctis duobus profunde impressis, antennis pedibusque nigris.

*Longit. 2 lin. Latit.  $\frac{5}{4}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*. Statura depressa et magnitudo B. *Pfeifferi* *Sahlberg*, sed thorax non nihil longior, postice magis angustatus et elytra profundius striata.

88. BEMBIDIUM KUPRIANOVII. Nigro-æneum, subdepressum, thorace quadrato, utrinque foveolato, bistriato elytris ovatis, subtiliter striatis, interstitio tertio punctis duobus impressis, antennarum basi, tibiis tarsisque rufo-piceis.

*Longit. 2 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Kuprianoff*.

Præcedente majus, latius, thorace breviore, postice vix angustato, elytris brevioribus, subtilius striatis, foveolis in interstitio tertio magis approximatis et colore antennarum pedumque distinctum.

89. BEMBIDIUM BIIMPRESSUM: Nigro-æneum, leviter convexum, thorace subquadrato, postice angustato, utrinque foveolato, bistriato, margine virescente, elytris ovatis brunneo-piceis, leviter striatis, interstitio tertio punctis duobus profunde impresiss, antennis pedibusque piceis.

*Longit. 2, 2 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{3}$  lin.*

Habitat in insula Sithka D. *Eschscholtz*, e museo Univ, Imp. Mosqu. ad describendum benevole communicavit D. *Fischer de Waldheim*. Proxime præcedenti nonnihil simile, sed paullo majus, convexius, thorace versus basin magis angustato, elytris latioribus magis rotundatis, levius striatis et colore diversum.

90. BEMBIDIUM QUADRIFOVEOLATUM : Nigro-aeneum, breviusculum, subdepressum, thorace quadrato, utrinque foveolato, bistriato, elytris oblongo-ovatis, subtiliter striatis, interstitio tertio punctis duobus profunde impressis, antennis pedibusque nigris.

*Longit. 1 $\frac{2}{5}$  lin. Latit.  $\frac{2}{3}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Kuprianoff*.

Præcedenti iterum affine, sed longe minus, thorace angustiore, elytrorum foveolis majoribus et colore antennarum pedumque facile distinguendum.

### HYDROCANTHARI.

91. DYTISCUS ANXIUS : Oblongo-ovalis, in elytris vix dilatatus, supra nigro-piceus, thoracis limbo omni, elytrorum laterali corporeque pallide flavis, coxarum posticarum laciniis acuminatis acutis.

*Longit. 13, 14 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 6 $\frac{2}{5}$  7 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

D. CIRCUMCINCTO *Ahrens*, *Erichson* valde affinis, sed ratio ne longitudinis nonnihil angustior, elytris apice pro-

fundius punctatis et coxarum laciniis minus acutis diversus mihi videtur.

Femina differt a male tarsis simplicibus, colore minus nitido, thorace magis plano et elytrorum apice fortius punctato.

92. ACILIUS ABBREVIATUS *Eschscholtz*: Oblongo-ellipticus, depresso, supra fusco-cinereus, subtus nigro-piceus, undique dense punctulatus, thoracis limbo vittaque transversa, fronte maculis verticalibus duobus, antennis, pedibus elytrisque ferrugineis, his creberrime et confertissime nigro-irroratis, fascia transversa postica pallescente ornatis, femoribus posticis ad basin paullulum infuscatis.

Mas: elytris laevibus; Femina: quadrisulcatis, sulcis glabris, prima tantum antice abbreviata.

*Longit. 7 lin. Latit. 3 $\frac{3}{4}$ , 4 lin.*

A. SEMISULCATUS VAR. *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 61.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 132. 4.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

A. SEMISULCATO *Dej.* major, longior et sulcis tribus exterioribus fere ad basin productis species distincta mihi videtur, eo magis quod A. SEMISULCATUS genuinus, quantum mihi innotuit, in insula Sitkha haud fuerit observatus.

93. COLYMBETES DIVISUS *Eschscholtz*: Elongato ovatus, supra flavicans, subtus niger, thorace in medio maculis duobus rotundatis nigris, elytris crebre nigro-irroratis, prosterno nigro.

*Var. b.* thorace maculis duobus transversis oblongo-quadratis, abdomine toto nigro-piceo, segmentis summo margine vix rufescens, pedibus intermediis piceo-maculatis, posticis fere totis nigro-piceis.

*Longit. 5<sup>4</sup>/<sub>5</sub> lin. Latit. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 248. 22.

RANTUS DIVISUS *Eschscholtz*, *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 62.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*. Var. b. e Museo Univ. Imp. Mosqv. ad describendum benevole communicavit D. *Fischer de Waldheim*.

94. ILYBIUS QUADRIMACULATUS *Aubé*: Oblongo-ovatus, minus convexus, posterius rotundatim attenuatus, niger, elytris lineola maculaque minima rotundata rufo-ferrugineis fenestratis.

*Var. b.* Supra nigro-aeneus.

*Longit. 5, 5<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 274. 3.

COLYMBETES QUADRINOTATUS *Eschscholtz*, *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 62.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

95. AGABUS TRISTIS *Aubé*: Elongato-ovalis, subdepressus, vix nitidus, striis anastomozantibus irregulariter strigosus, niger, antennis pedibus marginibusque thoracis et elytrorum rufescens.

*Longit. 4<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 356. 54.

**COLYMBETES PICIPES** *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit, p. 62.

**COLYMBETES ANGULARIS** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

**96. AGABUS DUBIUS**: Oblongo-ovalis, subdepressus, subnitidus, striis anastomozantibus irregulariter reticulato-strigosus, brunneo-piceus, antennis, pedibus, thoracis margine antico et lateribus elytrorumque margine antico et lateralí late ferrugineis.

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha D. D.<sup>r</sup> *Siegwald*.

Præcedenti proximus, sed multo brevior, posterius magis angustatus, reticulatione minus densa, magis conspicuat et thoracis elytrorumque margine antico late ferrugineis præcipue diversus.

**97. AGABUS HYPOMELAS**: Ovalis, subconvexus, nitidus, striis anastomozantibus subtilissime reticulato-strigulosus, nigro-æneus, subtus niger, antennis, pedibus, thoracis elytrorumque margine lateralí ferrugineis.

*Longit. 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 2 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz* Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Proxime præcedente multo brevior, posterius haud angustatus, sed elytris versus apicem rotundatis, superficie multo subtilius strigulosa et aliis notis diversus.

**98. HYDROPORUS GRISEO-STRIATUS** *De Geer*: Elongato-ovalis, depresso-fulvisculus, vix pubescens, supra testaceo-ferrugineus, subtus niger, ano ferru-

gíneo, capite in vertice et inter oculos nigro, thorace ad latera vix rotundato, angulis basalibus, antice et postice nigro, maculis rotundatis duobus ante basin nigro-notato, elytris lineis septem plus minusve confluentibus, præter suturam angustam, utrinque nigro-ornatis, lineis sexta et septina abbreviatis et in maculas confluentes interruptis, apice rotundato.

*Longit. 2 lin. Latit. 1 lin.*

*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 541. 49.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 64.—*Stephens*, Illustr. of British Entom. V. p. 39 t. Manuel of British Coleopt. d. 66. 505.

**HYPHYDRUS QUADRISTRATUS** *Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 107. 13.

**HYPHYDRUS GRISEOSTRIATUS** *Gyllenhal*, Insecta suecica. I. p. 523. 7.

Habitat in aquis insulæ Unalaschkæ frequens D. *Eschscholtz*.

\*99. **HYDROPORUS OBLONGUS** *Dejean*: Ovalis, valde elongatus, depressiusculus, punctulatus, subnitidulus, nigro-piceus, capite antice et in vertice vix ferrugineo, thorace ad latera oblique parum rotundato, elytris apice rotundatis, brunneis, vitta transversa ad basin maculaque ad latera ferrugineis, obsolete ornatis.

*Longit. 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin. Latit. 3/<sub>8</sub> lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 65.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 605. 93.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

100. **HYDROPORUS HUMERALIS** *Eschscholtz*: Oblongo-ovalis, depresso, subtiliter punctulatus, pubescens, supra nigro-brunneus, subtus niger, capite antice et in vertice, thoraceque ad latera fere oblique rotundata obsolete ferrugineis, elytris apice rotundatis, vitta transversa ad basin maculisque tribus irregularibus externis confusis rufo-ferrugineis.

*Longit. 1 1/4 lin. Latit. 1 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 65.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 578. 74.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

101. **GYRINUS PICIPES** *Eschscholtz*: Ovalis, convexus, coerulecenti-niger, nitidissimus, aeneo-limbatus, elytris striato-punctatis, striis internis subtilissimis, intersticiis planis laevibus, subtus nigro-aeneus, thoracis et elytrorum margine inflexo nigro-aeneo, pedibus ferrugineis, elytris apice truncatis, angulo exteriore rotundato.

*Longit. 2 1/2, 2 2/3 lin. Latit. 1 1/4, 1 1/2 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 66.—*Aubé*, Spec. gén. VI. p. 694. 27.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

## BRACHELYTRA.

102. HOMALOTA MARITIMA *Eschscholtz*: Linearis, depressa, nigra, subtiliter griseo-pubescent, antennis brevibus, thorace subquadrato, coleopteris vix angustiore, longitudinaliter impresso, abdomine supra parcius subtiliterque punctato, pedibus fusco-testaceis.

*Longit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha ad littora maris D. *Eschscholtz*.

Statura fere *TACHYUSÆ*, sed tarsi hujus generis.

103. HOMALOTA PICIPENNIS: Nigra, tenuiter pubescent, elytris piceo-castaneis, pedibus ferrugineis, thorace subquadrato, vix depresso, basi obsoletius foveolato, abdomine supra anterius parce subtiliterque punctato.

*Longit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Kuprianoff et Blaschke*.

H. sociali valde affinis et forsitan ejus varietas, sed thorace anterius minus angustato, basi obsoletius foveolato et antennis brevioribus diversa videtur.

104. ALEOCHARA CASTANEIPENNIS *Eschscholtz*: Nigra, subnitida, parce griseo-pubescent, elytris pedibusque piceo-castaneis, illis thorace longioribus, creberrime punctatis, thorace subrotundato, abdomine sublineari, supra parcius profunde punctato.

*Longit. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz.

A. FUMATÆ proxima, thorace anterius haud angustato, elytris longioribus et pubescentia densiore imprimis distincta.

105. ALEOCHARA SULCICOLLIS: Linearis, nigra, subnitida, pilis rigidis parce pubescens, thorace longitudinaliter profunde bisulcato, lateribus sparsim grosse punctato, elytris thoracis longitudine profunde rugoso-punctatis, abdomine parallelo parce punctulato, antennarum basi pedibusque rufo-piceis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  lin. Latit.  $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole communicatus.

A. BIMACULATA Gravenhorst minor, angustior, magis linearis, sulcis thoracis profundis et variis notis ab illa separanda.

106. TACHINUS NIGRICORNIS: Niger, nitidus, segmentorum abdominis marginibus pedibusque obscure rufo-piceis, thorace lateribus vix rotundato, elytris thorace fere duplo longioribus.

*Longit. 2 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz; Mus. Univ. Imp. Mosqu.

T. FLAVIPEDI Fabr. Erichson nonnihil affinis, sed thoracis lateribus vix rotundatis, elytris multo longioribus, annulis brevioribus crassioribus et colore distinctus.

Femina; abdominis segmento superiore sexto hisido, la-

cinia intermedia longiore, latiore, apice acute acuminata.  
Mas latet.

- \*107 **TACHINUS FRIGIDUS** *Erichson*: Niger, nitidus, antennarum basi, palpis, pedibus thoracisque limbo laterali rufo-ferrugineis, elytris thorace sesqui longioribus, piceis, puncto humerali margineque apicali ferrugineis.

*Longit. 2 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Erichson*, Genera et species Staphylinorum p. 256. 21.

Habitat in insula Unalaschka D. v. *Chamisso*.

Affinis **T. PALLIPEDI**, **RUFIPEDI** et **FLAVIPEDI** operis citati, ab hoc antennis basi rufis, ab illis statura minus convexa et capite thoraceque crebre evidentius punctatis distinguendus.

Mas: abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus acutiusculis, intermediis fortiter prominentibus; segmentis inferioribus 3—5 subimpressis, quinto apice leviter emarginato, margine intra sinum spongioso, sexto bifido, laciniis minus elongatis, compressis modice curvatis, acuminatis. Femina latet.

108. **TACHINUS PROPINQUUS**: Nigro-piceus, nitidus, antennarum basi, pedibus, thoracis latioris limbo, elytrisque castaneo-testaceis, his postice infuscatis.

*Longit. 2 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Kuprianoff* et *Blaschke*.

**T. MARGINELLO** *Fabr.* et **FIMETARIO** *Grav.* affinis, sed utroque major, multo latior et distinctius punctulatus.

Mas: abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus longitudine subæqualibus obtusis, segmento

inferiore quinto apice medio profunde sinuato, sinu utrinque carinula terminato, sexto profunde inciso, laciniis triangularibus modice acuminatis.

Femina; abdomine segmento superiore sexto apice quadrifido, laciniis triangularibus, acuminatis.

VAR. b. nigrior, thorace margine laterali et clytris nigris, margine tantum apicali rufescentibus.

109. **TACHINUS ELONGATUS** *Gyllenhal*: Elongatus, nigro-piceus, nitidus, antennis pedibusque rufis, elytris subtiliter substriato-punctatis, margine apicali rufiscente.

*Longit. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 4 lin. Latit. 5/₄, 1 lin.*

*Gyllenhal*, Insecta suecica II. 251. 1.—*Zetterstedt*, Fauna lapponica I. 61. I. Insecta lapponica 56. 1.—*Erichson*, Genera et Spec Staphylin p. 265. 34.

VAR. b. thorace clytrisque rufo-piceis.

**T. FERRUGINEUS** *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in insula Unalaschka DD. *Eschscholtz* et v. *Chamisso*; ubi tantum Var. b. lecta.

Mas: abdominis segmento superiore sexto quadridentato, dentibus minutis, intermediis paulo magis prominentibus; segmento inferiore quinto apice late profundeque emarginato, sexto bifido, laciniis validis, elongatis, compressis, fortius deorsum curvatis, apice acuminatis.

Femina: abdominis segmento superiore sexto apice quadrifido, laciniis subæqualibus, acuminatis.

110. **OTHIUS MACROCEPHALUS** *Eschscholtz*: Piceus, nitidus, palpis, antennis, capite thoraceque postice abdominalisque segmentorum marginibus rufescentibus, elytrorum dimidia parte

anteriore cum sutura pedibusque rufo-testaceis, thorace utrinque tripunctato, elytris subtiliter punctulatis, stria suturali impressa.

*Longit. 2 $\frac{1}{2}$ , 3 $\frac{1}{4}$  lin. Latit.  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  lin.*

*Erichson*, Gen. et Spec. Staphylin. p. 279. 5.

*GYROHYPNUS MACROCEPHALUS Nordman*, Symbolæ ad Monographiam Staphylinorum. p. 124. 26.

Habitat in insula Sitkha ad littora maris DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

Mas: capite thorace fere duplo latiore, quadrato, abdominis segmento sexto subtus apice emarginato.

Femina: capite thorace vix sesqui latiore, quadrato, abdominis segmento sexto subtus apice rotundato.

111. *OTHIUS CALIFORNICUS Eschscholtz*: Piceus, nitidus, ore, antennis thorace basi et apice pedibusque rufescentibus, thoracis seriebus dorsalibus 5-punctatis, elytris subtiliter punctulatis, stria suturali impressa.

*Longit. 2 $\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $\frac{1}{2}$  lin.*

*SAURIODES CALIFORNICUS?* *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit p. 72.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

*O. PILICORNI Paykull*, *Erichs.* similis, sed capite angustiore, thorace elytrisque longioribus ut et punctura thoracis distinctus.

112. *STAPHYLINUS VILLOSUS Gravenhorst*. Niger, nitidus, thorace antice utrinque cinereo-villoso, angulis posterioribus obtusis, elytris fascia cinerea, subtus pectore abdominalisque segmentis quatuor primis cinereo-tomentosis.

*Longit. 7, 9 lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Gravenhorst Microphra* p. 160. 2. Monog. *Micropt.* p. 126, 149.—*Erichson*, Gen. et Spec. *Staphylin.* p. 319. 4.

*CREOPHILUS VILLOSUS* *Nordman* Symb. ad *Monogr. Staph.* p. 21. 2.

*EMUS VILLOSUS* *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 67.

Habitat in California D. *Tschernikh*; in America septentrionali, Mexico et Cuba indigenus.

113. *STAPHYLINUS BICINCTUS* *Eschscholtz*: Niger, nitidus, thorace antice vix latiore, ibique utrinque dense cinereo-villoso, angulis posterioribus subrotundatis, elytris fascia angusta cinerea, abdomine subtus segmento secundo tertioque cinereo-tomentosis, pectore nigropubescente.

VAR. b. thorace omnino glabro denudato.

*Longit. 7 lin. Latit. 2 $\frac{1}{3}$  lin.*

*EMUS VILLOSUS* VAR. *MANDIBULARIS* *Eschsch.* *Dejean*. Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 67.

*CREOPHILUS FASCIATUS?* *Laporte* Etud. entom. p. 111.

Habitat in insula Sitkha DD. *Blaschke* et *Tschernikh*; Var. b. mihi dedit D. *Eschscholtz*.

*ST. ARCTICO* *Erichson* affinis, sed paullo angustior, thorace antice multo angustiore et antennis crassioribus diversus.

114. *STAPHYLINUS TARSALIS*: Nigro-fuscus, pubescens, capite thoraceque creberrime ruguloso-punctatis, carinula longitudinali lèvissima notatis, elytris atro-holosericeo-variegatis, ab-

domine bifariam atro-maculato, tarsis obscure ferrugineis.

*Longit. 6 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Tschernikh.*

Ad Fam. VIII. Gen. et Spec. Staphyl. cel. *Erichsonii* adnumerandus.

115. *PHILONTUS CALIFORNICUS Eschscholtz*: Niger, nitidus, elytris nigro-aeneis, capite subquadrato, thorace lateribus sub-sinuato, utrinque haud impresso, angulis anticis vix deflexis, seriebus dorsalibus quadripunctatis, abdomine subtilius punctulato, cinereo-pubescente.

*Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

Ph. aeneo, *Fabr.* magnitudine et statura valde affinis, sed colore, thoracis angulis anticis vix deflexis, lateribus haud impressis distinctus mihi videtur.

116. *PHILONTUS SIEGWALDII*. Niger, nitidus, femoribus coxisque anterioribus piceis, thorace seriebus dorsalibus punctis sex profunde impressis approximatis, elytris nigro-aeneis, dense et profunde punctatis, capite suborbiculato.

*Longit. 2 $\frac{1}{3}$ , 3 lin. Latit. 2/3, 5/4 lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Siegwald*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

Tarsi antice in utrinque sexu simplices. Maris abdomine segmento quinto ventrali apice profunde emarginato, feminæ integro.

117. PHILONTHUS ALBIONICUS *Eschscholtz*: Niger, subnitidus, pedibus cum coxis rufo-piceis, capite ovato, thorace seriebus dorsalibus punctis septem impressis, lateribus parce punctato.

*Longit. 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 3/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

Habitu fere Ph. *MICANTIS* Grav. sed major et variis notis ab illo distinguendus.

118. QUEDIUS PLAGIATUS: Niger, nitidus, thoracis margine antico, segmentorum abdominis marginibus, pedibus elytrisque rufis, his glabris sublaevibus, in utroque plaga magna nigro-fusca, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis.

*Longit. 3<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 3/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Qu. LÆVIGATO *Gyllenhal* valde affinis, sed thorax angustior, lateribus multo minus rotundato-dilatatis et color alias.

119. QUEDIUS PEDICULUS *Eschscholtz*: Niger nitidus, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis, elytris biseriatim punctatis, piceo-marginatis, fronte inter oculos quadripunctata.

*Longit. 3, 3<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 3/<sub>4</sub>, 1 lin.*

Erich on, Gen. et Spec. Staphyl. p. 531. 9.

PHILONTHUS PEDICULUS *Nordman*, Symb. ad Monogr. Staphyl. p. 79. 24.

Habitat in insula Unalaschka DD. *Eschscholtz* et v. *Chamisso*; frequentissimus in capillis Aleutorum adipe piscario vel phocæo immunde imbutis, unde denominatio.

120. *QUEDIUS BRUNNIPENNIS*: Nigro-æneus, subnitudus, elytris parce profunde punctatis, marginibusque segmentorum abdominalium rufo-brunneis, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis, fronte inter oculos bipunctata.

*Longit. 2<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 2/5 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*, Mas. Univ. Imp. Mosqu.

121. *QUEDIUS MOLOCHINUS Gravenhorst*: Niger, nitidus, antennis pedibusque rufo-piceis, elytris thorace brevioribus, castaneis, scutello punctulato, thoracis seriebus dorsalibus tripunctatis,

*Longit. 4, 5 lin. Latit. 1, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Erichson*, Gen. et Spec. Staphyl. p. 535. 18. Käfer der Mark Brand. I. p. 489. 8.

*STAPHYLINUS MOLOCHINUS Gravenhorst*, Monogr. Micrapt. p. 46. 6.—*Gyllenhal Insecta suecica* II. p. 302. 20.—*Sahlberg, Insecta fennica* I. p. 314. 17.—*Mannerheim, Précis des Brachelytr.* p. 25. 28.—*Rundt, Brachel. spec.* p. 5. 21.

*EMUS MOLOCHINUS Boisduval et Lacordaire, faune entom. des envir. de Paris* I. p. 377. 28.

*PHILONTHUS MOLOCHINUS Nordman*, Symb. ad Monogr. Staphyl. p. 76. 6.

**STAPHYLINUS LATICOLLIS** *Gravenhorst* Micropt. Brunsv. p. 173.

28. Mon. Micr. p. 47. 8.

**STAPH. PICIPENNIS** *Paykull*, Fauna suecica III. p. 373. 2.

**STAPH. LAPONICUS** *Zetterstedt*, Insecta lapponica p. 61. 12.

**STAPH. LIÆVCOLLIS** *Runde Brachel.* spec. p. 6. 21.

**MICROSAURUS MOLOCHINUS** *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> p. 69.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*, Mus. Univ. Imp. Mosqu., in omni Europa et America septentrionali obvius.

\*122. **QUEDIUS HYPERBOREUS** *Erichson*: Niger, pedibus anterioribus cum coxis antennisque piceo-testaceis; thoracis seriebus dorsalibus tri-punctatis, elytris thorace brevioribus, nigro-subæneis, subtiliter punctulatis.

*Longit. 3 lin.*

*Erichson*, Gen. et Spec. Staphyl. p. 547. 35.

Habitat in insula Unalaschka D. *Chamisso*.

123. **OXYTELUS FUSCIPENNIS**: Niger, nitidus, anten-narum basi pedibusque testaceis, elytris brun-neo-piceis, thorace trisulcato, fronte punctu-lata, antice impressa lævique.

*Longit. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 2/<sub>3</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Kuprianoff* et *Blaschke*.

**O. LUTEIPENNI** *Erichson* (PICEO *Gyllenhal*, *Mannerh.*) proximus, sed minor, fortius punctatus, frontis sulcis desici-entibus et colore clytrorum diversus.

Abdominis segmentum inferius sextum maris integrum, septimum leviter bisinuatum, lobo intermedio in mu-cronem parvum producto. Femina latet.

124. ANTHOPHAGUS LATICOLLIS : Niger , pubescens , crebre subtiliterque punctulatus, fronte lineis duabus obliquis profunde impressis in vertice connexis, thorace brevi lato subquadrato, subdepresso, ad angulos utrinque impresso , medio tenui canaliculato.

*Longit. 1 $\frac{2}{5}$  lin. Latit.  $\frac{3}{4}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Kuprianoff.

A. PLAGIATO *Paykull* colore subsimilis , sed nigrior, obscurior et thoracis structura ab omnibus congeneribus distinguendus.

125. ARPEDIUM TESTACEUM *Eschscholtz*: Pallide testaceum, parum nitidum , capite pectoreque nigris, oculis magnis prominulis , capite thoraceque subquadrato crebre subtilissime punctulatis , hoc medio canaliculato , lateribus late explanato , elytris fortius profundiusque punctatis.

VAR. b. abdomine etiam nigro.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$ , 2 lin. Latit.  $\frac{2}{3}$ , 4 lin.*

HETEROPS TESTACEUS *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* , Kuprianoff et Blaschke.

126. ARPEDIUM MACULICOLLE : Nigrum , parum nitidum, antennarum basi , thorace elytris pedibusque pallide flavo-testaceis, thorace subquadrato , lateribus late explanato , dorso medio nigro, elytris fortiter transversim rugosis.

*Longit. 1 $\frac{3}{4}$  lin. Latit.  $\frac{3}{4}$  lin*

Habitat in insula Sitkha D Tschernikh.

127. **OMALIUM PLAGIATUM**: Nigrum, nitidulum, antennis pedibusque testaceis, elytris antrorsum plaga utrinque magna obliqua rufo-ferruginea, capite thoraceque creberrime subtilissime, elytris paulo fortius punctatis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  lin. Latit.  $\frac{2}{3}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

128. **ANTHOBIUM FIMETARIUM** *Eschscholtz*: Depressum, rufo-piceum, subnitidum, crebre punctatum, antennarum basi, thoracis elytrorumque limbo pedibusque pallidioribus, capite nigro, thorace transverso canaliculato, elytris substriatis, abdomen fere totum obtegentibus, maris truncatis, feminæ apice interiore sinuato-acuminatis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$ , 2 lin. Latit.  $\frac{3}{4}$ , 1 $\frac{1}{3}$  lin.*

Erichson, Genera et Spec. Staphylin. p. 899. 19.

**OMALIUM FIMETARIUM** *Mannerh.* Précis des Brachel. p. 52. 10.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz.

129. **ANTHOBIUM POTHOS** *Eschscholtz*: Rufo-testaceum, capite thoraceque transverso canaliculato subtiliter punctulatis, elytris abdomine parum brevioribus profunde punctatis, apice in utroque sexu truncatis, abdomine maris nigro.

*Longit. 1, 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 2<sub>3</sub>, 5<sub>4</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

A. OPHTHALMICO *Paykull* majus, convexius et ab illo in multis diversum.

### STERNOXI

\*130. APATURA DRUMMONDI *Kirby*: Supra nigro-aenea, subtus ænea, nitida; prothorace varie acuducto disco fere concentrice; elytris punctulatis integerrimis, guttis tribus luteis triangulo ordinatis.

VAR. b. Elytris maculis quatuor luteis: 2, 1, 1.

*Longit. 5 lin. Latit. 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Laporte et Gory* Monographie des Buprestides, Apatura p. 3. Tab. 1. fig. 3.

BUPRESTIS (TRACHYPTERIS) DRUMMONDI *Kirby* in *Richardson* Fauna boreali-americana IV. p. 159. 11. Tab. II. fig. 2. Var. b.

BUPRESTIS DISCOPUNCTATA? *Faldermann*, Bullet. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 47. Tab. 2. fig. 5.

APATURA DISCOPUNCTATA? *Laporte et Gory* l. c. p. 3. Tab. 1. fig. 2.

BUPRESTIS GUTTULATA? *Gebler*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VIII. p. 41. 5.

PHÆNOPS GEBLERI? *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 89.

Habitat in California et in Rocky Mountains Amer. bor. *Kirby*; etiam in Mongolia et Sibiria, si BUPR. DISCOPUNCTATA eadem sit species.

131. BUPRESTIS RUSTICORUM Kirby: Nigro-ænea, nitida, fronte, genis ventrisque lateribus fulvo-maculatis, elytris granulatis profunde striatis, apice rotundatis.

*Longit. 9 lin. Latit. 3 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Laporte et Gory*, Monographie des Buprest. Suppl. p. 117  
Tab. 20. fig. 115.

BUPRESTIS (ANOPLIS) RUSTICORUM Kirby in Richardson Fauna boreali-americana IV. p. 151. 1.

VAR. b. segmento ultimo ventrali basi transversim sanguineo, reliquis immaculatis, cætera ut in a.

Habitat in California. Specimen a B. Amirali Wrangel, allatum in Mus. Imp. Acad. Scient. Petropolit. assertatur.

132. BUPRESTIS LANGII: Oblonga, depressa, viridi-aurea, capite thoracisque disco coerulecentibus, capite rugoso, thorace profunde punctato, elytris dense costatis, interstitiis rugulosis, apice truncatis, muticis.

*Longit. 8 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

\*133. ANTHAXIA ÆNEOGASTER Reiche: Supra nigro-purpurea, thorace lateribus rotundato, elytris punctis rotundatis impressis, corpore subtus pedibusque nigris, nitidis.

*Longit. 2 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{4}{5}$  lin.*

*Laporte et Gory*, Monogr. des Buprest. Anthaxia p. 32.  
Tab. 7. fig. 44.

Habitat in California.

\*134. EPIPHANIS CORNUTUS *Eschscholtz*: Rufo-ferrugineus, capite nigro, antennis articulis quatuor ultimis elongatis (\*), fronte cornu compresso, thorace transverso nigro, angulis posticis ferrugineis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zoolog. Atlas. I. p. 10. Tab. IV. fig. 6.—In Thon Entomologisches Archiv. II. 1. p. 35.—Laporte in Silbermann, Revue entom. III. p. 177.

Habitat in insula Sitkha rarissime, specimen unicum prope truncum vetustum Pini volitans cepit D. *Eschscholtz*.

\*135. CARDIOPHORUS LATIUSCULUS *Eschscholtz*: Niger, frontis margine reflexo, thorace lato canaliculato, fusco-tomentoso, pedum geniculis ferrugineis.

*Longit. 3<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Eschscholtz* in Thon, Entomol. Archiv. II. 1. p. 34.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

136. CARDIOPHORUS CALIFORNICUS: Elongatus niger, punctatissimus, tenue pubescens, thorace convexo, subquadrato, elytris dorso depresso, leviter punctato-striatis, sterno profunde punctato, convexo, tarsis articulis omnibus et unguiculis simplicibus.

(\*) Die Beschreibung der Fühlhörner, als zur Charakteristik der Gattung gehörend, wird in der vollständigen Fauna, wo diese Charakteristik besonders auseinander gesetzt wird, aus der Art Diagnose weggelassen werden.

*Longit. 5<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in California DD. *Blaschke et Tschernikh.*

137. *CARDIOPHORUS TANTILLUS*: Oblongus, niger, fusco-pubescent, profunde punctatus, thorace convexo, lateribus haud dilatato, elytris profunde punctato-striatis, tarsorum articulo quarto appendiculato, unguiculi simplicibus

*Longit. 2 lin. Latit. 3/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

138. *CRYPTOHYPNUS NOCTURNUS Eschscholtz*: Supra nigro-æneus pilosus, thorace planiusculo, medio dilatato punctulato, elytris simpliciter striatis, in interstitiis punctulatis, antennis nigris, pedibus fuscis, tarsis articulis simplicibus.

*Longit. 3, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 105.*

*HYPOLITHUS NOCTURNUS Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.* II. 1. p. 33.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz, Kuprianoff et Blaschke.*

\*139. *CRYPTOHYPNUS MUSCULUS Eschscholtz*: Brevis, æruginosus, pubescens, thorace lato rotundato, convexo, elytris striatis, interstutiis rugulosis, pedibus flavis, geniculis fuscis, tarsis articulis simplicibus.

*Longit. 1<sup>1</sup>/<sub>5</sub> lin.*

*HYPOLITHUS MUSCULUS* *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.*

II. 1. p. 33.

*ELATER MUSCULUS* *Eschscholtz*, *Entomographien* p. 70. 42.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

140. CRYPTOHYPNUS CINEREIPENNIS *Eschscholtz*: Nigro-fuscus, thorace brevi, medio dilatato, convexo, parcus punctulato, saepe angulis omnibus ferrugineis, elytris striatis brunneo-piceis, tarsis articulis quarto appendiculato.

*Longit. 2 $\frac{1}{4}$ , 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1, 2 lin.*

*MONOCREPIDIUS CINEREIPENNIS* *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.* II. 1. p. 32.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 98.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Siegwald*.

141. CRYPTOHYPNUS PUBERULUS : Nigro-fuscens, griseo-pubescentia, thorace punctatissimo, lateribus vix dilatato, angulis posticis rufescensibus, elytris punctato-striatis, basi rufescensibus, tarsis articulo quarto appendiculato.

*Longit. 1 $\frac{3}{4}$  lin. Latit. 3/4 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

Præcedente paullo minor, pubescentia et punctura multo densiore, thoraceque angustiore diversus.

142. ELATER CARBONICOLOR *Eschscholtz*: Ater, angustus, nigro-pubescentia, thorace longiore subtiliter punctato, elytris profunde punctato-striatis, antennis nigris, pedibus fuscis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 lin.*

*Eschscholtz*, in *Entomol. Archiv.* II. 1. p. 33.

**AMPEDUS CARBONICOLOR** *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 105.

Habitat in insula Sitkha DD, *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

\*143. **DIACANTHUS RESPLENDENS** *Eschscholtz*: Cupreо-æneus, nitidissimus, glaber, elytris viridibus, sparsim et subtilissime punctulatis, thorace subquadrato punctatissimo.

*Longit. 6 lin.*

**LUDIUS RESPLENDENS** *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.* II.  
1. p. 34.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 107.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

144. **DIACANTHUS ANGUSTICOLLIS** : Elongatus, nigro-æneus, griseo-pilosus, thorace elongato profunde punctato, angulis posticis productis, divaricatis, apice truncatis, elytris punctato-striatis, margine pedumque geniculis rufoferrugineis.

*Longit. 6 lin. Latit. 1 $\frac{3}{4}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

145. **DIACANTHUS SERRICORNIS** : Elongatus, fusco-testaceus, punctatissimus, griseo-pubescentes, thoracis angulis posticis valde productis divaricatis, elytris striatis, antennis serratis, corpore subtus pedibusque piceo-testaceis.

*Longit. 4 lin. Latit. 1\frac{1}{2} lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

\*146. **DIACANTHUS VOLITANS** *Eschscholtz*: Niger, tenui tomentosus, thoracis lateribus, elytris

pedibusque rufo-ferrugineis, thorace elongato,  
densissime punctulato, lateribus explanato.

VAR. b. elytris brunneis.

*Longit. 7, 8 $\frac{1}{2}$  lin.*

LUDIUS VOLITANS *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.* II. t  
p. 34.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 107.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

\*147. DIACANTHUS SAGITTICOLLIS *Eschscholtz*: Niger,  
flavo-pilosus, elytris pedumque geniculis rufo-  
ferrugineis, thorace elytris angustiore, pun-  
ctatissimo, angulis posticis spinis angustis di-  
varicatis.

*Longit. 6 lin.*

LUDIUS SAGITTICOLLIS *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.*  
II. 1. p. 34.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 107.

Habitat in Sitkha D. *Eschscholtz*.

148. DIACANTHUS UMBRICOLO *Eschscholtz*: Elongatus,  
niger, cinereo-pilosus, thorace elongato, late-  
ribus densissime punctato, in medio sparsim  
punctulato, basi angustato, angulis latioribus  
divaricatis rufis, antennarum articulo tertio  
elongato.

VAR. b. angulis posticis thoracis fuscis.

*Longit. 5, 6 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ , 1 $\frac{2}{3}$  lin.*

LUDIUS UMBRICOLO *Eschscholtz* in *Thon Entom. Archiv.* II.  
1. p. 34.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 107.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et  
*Blaschke*.

**149. DIACANTHUS LOBATUS** *Eschscholtz*: Oblongus, niger, subæneus, cinereo-pubescent, thorace elongato sublineari, angulis posticis productis divaricatis, apice ipso truncatis, lobo medio marginis postici emarginato, antennarum articulo tertio elongato.

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin.*

**ELATER LOBATUS** *Eschscholtz* Entomographien p. 69. 41. (♀).

**LUDIUS LOBATUS** *Eschscholtz* in Thon Entom. Archiv. II. 1. p. 34.

**LUDIUS CARICINUS** *Eschscholtz*, Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 107. (♂).

Habitat in insulis Unalaschka et Sitkha DD. *Eschscholtz* et Kuprianooff.

**\*150. DIACANTHUS DIVERSICOLOR** *Eschscholtz*: Ater, glaber, nitidus, thorace rufo, convexo, vase punctulato, tenue canaliculato, basi coarctato, angulis posticis acutis nigris, elytris nigro-aeneis.

*Longit. 5 lin.*

**LUDIUS DIVERSICOLOR** *Eschscholtz* in Thon Entom. Archiv. II. 1. p. 34.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

**151. DOLOPIUS CALIFORNICUS** *Dejean*: Elongatus, fuscus, pubescens thoracis marginibus omnibus, elytrorum sutura, antennis pedibusque fusco-ferrugineis, thorace punctatissimo, elytris striatis, interstitiis subtiliter transversim rugulosis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 lin.*

*Dejean*, Cat 3<sup>me</sup> édit. p. 108.

DOLOPIUS LATERALIS *Eschscholtz* in *Thon*, Entom. Archiv.

II. 1. p 34

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

152. ATHOUS FERRUGINOSUS *Eschscholtz*: Elongatus, fuscus, elytris, abdomine, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, thorace elongato punctatissimo, angulis posticis ferrugineis, maris antrorum angustato, angulis posticis nonnihil productis, feminæ lateribus parallelis, angulis posticis obtusis magis divaricatis; elytris punctatis leviter punctato-striatis.

*Var. b. rufo-ferrugineus, capite nigro-fusco.*

*Var. c. fusco-piceus, antennis, elytrorum margine, geniculis, tibiis tarsisque ferrugineis.*

*Longit. 4, 6 lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{2}$ , lin.*

*Eschscholtz* in *Thon* Entom. Archiv. II. 1. p. 33.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 102.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke.*

153. ATHOUS PALLIDIPENNIS: Elongatus, niger, griseo-pubescent, elytris ferrugineo-testaceis punctatis, obsolete punctato-striatis, thorace oblongo, antrorum angustato, punctato, obsolete canaliculato.

*Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{4}{5}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke.*

**A.** SCRUTATORI *Herbst* colore similis sed minor et multo angustior.

\*154. *Athous rufiventris* *Eschscholtz*: Ater, fronte excavata, thorace punctatissimo, angulis basi planis, elytris castaneis, abdomine pedibusque rufo-ferrugineis.

*Longit. 5 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz* in *Thon*, Entom. Archiv. II. 1. p 33.

**ELATER RUFIVENTRIS** *Eschscholtz*, Entomographien p. 71. 43.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

### MALACODERMI.

155. **DICTYOPTERUS HAMATUS** *Eschscholtz*: Valde elongatus, sanguineo-coccineus, subtiliter pubescens, thorace brevi, obsoletius reticulato-costato, elytris costatis, interstitiis latioribus bifarium reticulatis, antennis elongatis subserratis abdomineque nigro, coxis posterioribus productis acutis.

*Longit. 5, 7 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$ , 2 $\frac{1}{3}$  lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 112.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

156. **DICTYOPTERUS SIMPLICIPES** *Eschscholtz*: Elongatus, sanguineus, thorace longiore, elevatius reticulato-costato, medio infuscato, elytris costatis, interstutiis angustioribus, bifarium reticulatis, antennis brevioribus crassis sub-

setaceis, corpore subtus coxis haud productis  
tarsisque nigris.

*Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 112.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

Præcedente multo minor, brevior, thoracis longioris stru-  
ctura et coxis inermibus mox distinguendus.

157. *RHAGONYCHA PINIPHILA Eschscholtz*: Linear-  
elongata, nigra, pubescens, mandibulis, palpis,  
antennarum articulis tribus baseos subtus  
obscure testaceis, thorace longiore subqua-  
drato, dorso canaliculato, utrinque longitudi-  
naliter subcarinato.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 2/3, 1 lin.*

*Eschscholtz*, Bulletin de la Soc. Imp. de Moscou II. p. 65.

*PODABRUS PINIPHILUS Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 118.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et  
*Blaschke*.

158. *CANTHARIS NOTATA*: Nigro-fusca, pubescens,  
fronte, ore, antennis, thorace oblongo-qua-  
drato, pedibus abdominisque margine rufo-  
ferrugineis, thoracis disco macula parva un-  
dulata nigra, elytris rugoso-punctulatis, ele-  
vato-lineato.

*Longit. 4 lin. Latit. 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

159. *SILIS PALLIDA Eschscholtz*: Elongata, nigra,  
mandibulis geniculisque pallidis, thorace ely-

trisque luteo-testaceis, nigro-limbatis, thorace transverso inaequali postice utrinque profunde exciso, angulo basali hamato.

*Longit. 2, 2<sup>5</sup>/<sub>8</sub> lin. Latit. 5/<sub>8</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 121.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

160. **COLLOPS HISTRIO** *Eschscholtz*: Niger, capite antice antennarumque basi testaceis, thorace rufo, elytris testaceis maculis duabus nigro-virescentibus.

Mas: antennarum articulo primo incrassato, tertio maximo irregulari intus concavo, tarsis anticis 4-articulatis.

Femina: antennarum articulis 1 et 3 reliquis crassioribus, simplicibus tarsis omnibus 5-articulatis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>5</sub> lin.*

*Erichson*, Entomographien p. 59. 9.

**MALACHIUS HISTRIO** *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 122.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

161. **DASYTES LATICOLLIS**: Oblongis, subcylindricus, supra nigro-aeneus, remote punctulatus, parce griseo-pubescent, subtus niger, capite lato clypeo triangulari, thorace transverso, elytrorum latitudine, elytris dorso subdepressis.

*Longit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 2/<sub>5</sub> lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

162. *DASYTES PARVICOLLIS*: *Elongatus*, *subcylindricus*, supra nigro-æneus, remote subtilius punctulatus, dense griseo-pubescent, subtus niger, capite minore rotundato, thorace elytris angustiore subrotundato, elytris dorso subconvexis.

*Longit. 1 $\frac{1}{4}$  lin. Latit.  $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

163. *DASYTES CANESCENS Eschscholtz*: *Oblongus*, *subcylindricus*, *nigro-æneus*, *griseo-pubescent*, *thoracis medio et lateribus elytrorumque macula utrinque baseos humerum ambiente et fasciis duabus posterioribus transversis denudatis*, *antennis basi rufo-testaceis*, *thorace elytrorum fere latitudine*.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  lin. Latit.  $\frac{1}{3}$  lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 125

Habitat in California D. *Eschscholtz*; ad describendum benevole communicavit Excell. D. *Fischer de Waldheim.*

### TEREDILES.

164. *CLERUS EXIMIUS*: *Niger*, *hirtus*, *capite thorace*, *corpore subtus pedibusque dense canopilosis*, *thorace maculis duabus nigris*, *elytris nigro-cyaneis*, *macula triangulari baseos*, *fascia media anterius acuminata*, *margine cum macula basali connexa suturaque posterius coc-*

cineis, elytrorum apice cano-piloso, medio nigro-maculato.

*Longit. 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Lectus a D. Blaschke in nave e California ad Americanam meridionalem iter faciente, ideoque verosimile Californiae incola.

165. *CORYNETES RUFIPES* *Fabricius*: Viridi-cærulescens, supra nigro-pilosus, subtus griseo-pubescentia, thorace punctulato, elytris striatopunctatis, antennarum basi pedibusque rufis.

*Longit. 2 $\frac{1}{3}$ , 2 $\frac{1}{2}$ , lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{4}$ , lin.*

*Fabricius*, Systema Eleuther. I. p. 286. 2.—*Herbst*, Natur. syst. aller Ins. IV. p. 151, 2.

*Schönherr*, Synonym. Insect. II. p. 51. 2.—*Boisduval*, Faune entom. de l'Océanie p. 143.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 127.

*NECROBIA RUFIPES* Olivier Entomologie IV. 76 bis. p. 5. 2. Tab. 1. fig. 2. a. b.—*Latreille* Hist. nat. des Crust. et des Ins. IX. p. 156. 2.—*Stephens* Illustr. of British Entomology. III. p. 327. Manual of British. Coleopt. p. 178. 1570.

VAR. b. Cœruleo-violaceus, elytris subtiliter rugulosis, cætera ut in a.

C. RETICULATUS *Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California; VAR. a. a D. Blaschke, VAR. b. à DD. Eschscholtz et Blaschke allatæ. Occurrit in Europa meridionali, Asia, Africa, America et Nova Hollandia.

166. *ANOBIUM PANICEUM* *Linné*. Ovatum, breve, subcylindricum, ferrugineum, sericeo-pubescentia, thorace convexo æquo, elytris tenuie

striatis, punctis minutissimis in striis impressis, interstitiis subtilissime rugulosis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$ , 2 lin. Latit.  $\frac{2}{3}$ , 1 lin.*

*Fabr. Syst. El. I. p. 323. 9.—Oliv. Entom. II. 16. p. 10. 8. T. 2. fig. 9. a, b.—Herbst. Natursyst. V p. 59. 5. Tab. 47. fig. 6.—Gyllenhal, Ins. suec. I. p. 293. 5.—Schönherr, Syn. Ins, II. p. 105. 15.—Latreille Hist. natur. des Crust. et des Ins. IX. p. 183. 5.—Sturm, Deutschl. Fauna. XI. p. 135. 18.—Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 130.—Stephens, Illustr. of British Entom. III. 340. Manual of British Coleopt. p. 201. 1596.*

*DERMESTES PANICEUS Linné*, Fauna suecica p. 145. 431.  
Systema Naturæ I. II. p. 564. 19.

Habitat in California D. Blaschke; insectum per totam orbem obvium.

167. *PTINUS FUR* *Linné*: Fusco ferrugineus pubescens, thorace quadri-fasciculato, elytris crenato-striatis interrupte albo-bifasciatis, femoribus elongatis, clavatis.

Mas: elytris oblongis subcylindricis.

Femina: elytris gibbosis ovatis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  2 lin. Latit.  $\frac{2}{3}$ , 1 lin.*

*Linné Systema Naturæ II. p. 566. 5.—Fabr. Syst. El. I. p. 325. 6.—Oliv. Entom. II. 17. p. 6. 3. Tab. fig. 1—Latreille. Hist. nat. des Crust. et des Ins. IX. p. 173. 2.—Gyllenhal, Ins. succ. I. p. 307. 5.—Schönherr, Syn. Ins. II. p. 107. 5.—Stephens Illustr. of British Entom. III. 334. Manual of British Coleopt. p. 200. 1581.—Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 130.*

*CERAMBIX FUR* *Linné*, Fauna succ. p. 190: 657.

VAR. b. *testaceus* *immaculatus*.

*PTINUS LATRO* *Fabr.* *Syst. El.* I. p. 326. 9. (♂).—*Oliv. Ent.*  
II. 17. p. 7. 4. Tab. 1. fig. 3. (♀).

*PTINUS TESTACEUS* *Oliv. Ent.* II. 17. p. 9. 8. Tab. 2. fig.  
9. (♂).

Habitat in insula Sitkha et in California D. *Blaschke*.  
Species valde noxia in omnibus terræ regionibus vul-  
gata.

### CLAVICORNIA.

168. *NECROPHORUS NIGRITA*: Niger, thorace glabro,  
basi punctato, elytris supra æqualibus sub-  
tiliter punctulatis, seriebus tribus e punctis  
minutis impressis, antennarum clava aurantiaca,  
pectore nigro-piloso, abdomine glabro,  
tibiis posticis rectis.

*Longit. 9 lin. Latit. 4 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

*N. HUMATORI Gæze* similis, elytris subtiliter punctulatis,  
absque ullis lineis elevatis pectoreque nigro-piloso ab  
illo vero omnino diversus. *N. LATERALIS* et *AUROPILOSUM*  
*Eschsch.*; e California in Catalogo ill. Com. *Dejean*  
inscripti, mihi ignoti, sed vix ad speciem jam de-  
scriptam referendi.

169. *NECROPHORUS MARITIMUS* *Eschscholtz*: Niger,  
thorace glabro, antennarum clava elytrorum-  
que fasciis duabus aurantiacis, pectore dense  
griseo-pubescente, abdomine glabro, tibiis  
posticis rectis.

VAR. b. feminæ; fascia elytrorum anteriore evanescente, loco ejus punctis tantum duobus in utroque elytro, et margine inflexo angustius aurantiaco.

VAR. c. utriusque sexus, ut VAR. b., sed fascia elytrorum anteriore omnino deficiente et posteriore angustiore.

*Longit. 9 lin. Latit. 3<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 131.

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*;

VARIET. c. Mus. Univ. Imp. Mosqu. specimina tria examinavi.

N. RUSPATORI *Erichson* (VESTIGATORI *Gyllenh*) similis, sed differt imprimis elytris longioribus, postice latioribus, dorso magis depresso et fasciis angustioribus, abdomine toto glabro.

170. SILPHA CERVARIA *Eschscholtz*: Ovata, leviter convexa, nigra, opaca, thorace antice parum emarginato, supra coriaceo, elytris lineis tribus elevatis undulatis, interstitiis lineis confuse ramosis.

VAR. b. elytris obscure virescente-aeneis, evidentius granulato-punctatis.

*Longit. 6 lin. Latit. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 132.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*; specimen VAR. a. benevolentiae D. Obert debo; VAR. b. in Mus. Univ. Imp. Mosqu. asservata ad describendum communicavit D. *Rouillier*.

Statura et magnitudo S. RETICULATÆ Fabr. thorace convexo coriaceo ei similis, sed thorax in hac specie anterius angustatus apice nonnihil emarginatus et elytrorum sculptura valde diversa.

171. SILPHA CALIFORNICA *Eschscholtz*: Ovata, brevis, depressa, nigra, capite thoraceque griseotomentosis, elytris trilineatis, interstitiis tubercululis globosis, subseriatis.

Femina: elytris apice sinuatis, juxta suturam valde candato-productis.

Mas latet.

VAR. b. tuberculis in interstitiis elytrorum longe ante apicem evanidis.

*Longit. 4<sup>5</sup>/<sub>4</sub>, 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 3, 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 132.

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.* VAR. b. a D. Dr. *Fischer* ad Ross capta.

S. CAUDATÆ Say (TURBERCULATE *Germar*) affinis, sed brevior, lation, thoracis basi magis sinuato et elytrorum tubercululis rarioribus distincta.

172. NECROPHILUS HYDROPHILOIDES *Eschscholtz*: Ovatus, convexus, brunneo-piceus, thoracis elytrorumque marginibus dilutioribus, thorace transverso, apice angustato, elytris profunde crenato-striatis.

*Longit. 5 lin. Latit. 3 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 132.

PTOMOPHAGA HYDROPHILOIDES *Eschscholtz* in litteris.

Nº II. 1843.

PELATES ESCHSCHOLTZII Fischer de Waldheim in litteris.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz.

N. SUBTERRANEO Illiger fere quadruplo major, longior, thorace breviore et variis notis distinctus.

173. CATOPS CADAVERINUS Eschscholtz: Oblongo-ovatus, fusco-piceus, tenue pubescens, antennis mediocribus, clavatis, basi ferrugineis, thorace brevi transverso, basi parum latiore, angulis posticis obtusis, elytris rufescentibus punctatis, stria suturali impressa, pedibus ferrugineo-piceis, femoribus infuscatis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 lin.*

CATOPS FUSCUS Hoffmannsegg VAR. Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit.  
p. 133.

Habitat in insula Sitkha DD. Eschscholtz et Kuprianoff.

C. MORIONI Fabr. Erichs. (fusco Gyllenh.) nonnihil affinis, thorace minore, angustiore et elytris longioribus ab illo distinguendus.

174. CARPOPHILUS HEMIPTERUS Linné: Oblongo-ovatus, supra nigro-fuscus, pubescens, elytris dimidiatis, macula humerali apiceque late flavis, pedibus ferrugineis.

*Longit. 1 $\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $\frac{2}{3}$  lin.*

Stephens, Illustr. of British Entom. III. 50. Manual of British Coleopt. p. 122. 974.

NITIDULA BIMACULATA Oliv. Entom. II. 12. p. 6. 5. Tab. 2. fig. II. a. b.—Gyllenhal, Ins. suec. I. p. 244. 34.—Schönherr, Syn. Ins. II. p. 147. 58.

**NITIDULA FLEXUOSA** Paykull, Fauna suec. I. p. 354. 9.—  
Herbst, Natur—Syst. V. p. 246. 21. Tab. 54. fig. 5.

**DERMESTES DEMIPTERUS** Linné, Syst. Nat. I. II. p. 565. 50.

**IPS BIMACULATA** Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 134.

Habitat in California D. Blaschke; ex Europa cum rebus mercatoriis verosimile allatus.

**175. STRONGYLUS? TINCTUS:** Nigro-fuscus, opacus, creberrime punctulatus, griseo-pubescent, thorace convexo, elytris abbreviatis, macula discoidali obsoleta ferruginea, antennis pedibusque rufis. (\*)

Longit.  $2\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $1\frac{1}{4}$  lin.

Habitat in California D. Tschernikh.

**176. NITIDULA CONVEXIUSCULA:** Ovata, convexa, diluta testacea, punctatissima, thorace antice emarginato, elytris apice singulatim rotundatis.

Longit.  $1\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $\frac{2}{3}$  lin.

Habitat in insula Sitkha DD. Kuprianoff et Blaschke.

**N. DEPRESSÆ** Illig. Gyllenhal minoribus individuis valde affinis, thorace autem paulo angustiore, antice profun-

(\*) Der abgekürzten Flügeldecken wegen wäre diese Art wohl eigentlich zu **STRONGYLUS** nicht zu rechnen, allein da ich die Gattungen **BRACHYPEPLUS** und **CALOPTERUS** Erichson eben so wenig als **CILLEUS** Laporte kenne, wage ich nicht darüber zu entscheiden, sondern lasse lieber diese Art mit den ihr verwandten, nach Dejean, unter **STRONGYLUS** bleiben.

dius emarginato et elytris apice rotundatis imprimis diversa.

177. **NITIDULA AMBIGUA**: Oblonga, subdepressa, rufo-ferruginea, punctatissima, tenue fulvo-pubescent, marginibus dilutioribus, thorace antice leviter emarginato, elytris apice singulatim rotundatis.

*Longit. 1 $\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz.* Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Media inter N. PYGMÆAM *Gyllenhal* et OBLONGAM *Herbst*, *Gyllenhal*, illa longior, in elytris magis parallela, hac paulo convexior, utrisque fortius punctulata.

178. **CRYPTOPHAGUS CALIFORNICUS**: Oblongo-ovatus, convexus, pallide testaceus, punctatus, pilis flavis pubescens, thorace anterius angustiore, medio transversim impresso, margine laterali acuto serrato.

*Longit. 1 lin. Latit.  $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. *Blaschke.*

179. **CRYPTOPHAGUS QUADRIDENTATUS**: Oblongo-ovatus, fusco-ferrugineus, pilis flavis pubescens, capite thoraceque profunde punctatis, thoracis lateribus utrinque acute bidentatis, postice crenulatis, elytris subtilius punctulatis.

*Longit. 1, 1 $\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke.*

C. LYCOPERDI *Fabr.* affinis, sed angustior, antennis crassio-

ribus, thorace fortius punctato, lateribus acutius dentato, posterius crenulato distinctus.

Variat colore totius corporis pallidius ferrugineo.

180. DERMESTES VULPINUS *Fabricius*: Oblongus, niger, cinereo-subpubescens, subtus niveus, maculis marginalibus denudatis atris, thoracis lateribus densius cinereo-villosis.

*Longit. 3, 4 lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 1<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Fabr. Syst. El. I. p. 314. 12.—Oliv. Entom. II. 9. p. 8. 4. Tab. I. fig. 6.—Herbst Natur-Syst. IV. p. 124. 5. Tab. 40. fig. 5. c.—Schönherr Syn. Ins. II. p. 89. 21.—Gyllenhal, Ins. suec. I. p. 147. 2.—Stephens Illustr. of British Entom. III. 123. Manual of British Coleopt. p. 143. 1153.—Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 139.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; per totum orbem terrarum obvius.

181. DERMESTES LUPINUS *Eschscholtz*: Oblongus, piceus, dense fusco-cinereo-tomentosus, subtus niveus, nigro-maculatus, thoracis lateribus densius cinereo-villosis.

*Longit. 3<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin. Latit. 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin.*

*Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> p. édit. 139.*

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

Statura et magnitudine præcedentis, sed subtilius punctulatus et pubescentia multo densiore fusco-cinerea imprimis diversus.

182. DERMESTES TALPINUS *Eschscholtz*: Oblongus, niger, supra cinereo-fulvoque marmoratus, scutello dense fulvo-pubescente, subtus ni-

veus, abdominis margine nigro-punctato, antennis nigris, articulo ultimo rufo-piceo.

*Longit. 3 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

D. CATTÀ *Panz. Var. Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 139.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. a D. *Rouillier* ad describendum benevole communicatus.

D. MURINO *Linné minor*, maculis cinereis elytrorum vix vel perparum undulatis et maculis fulvis immixtis sparsis diversus mihi videtur, cæterum forma eadem, unde ut varietas ejus facile putandus.

183. DERMESTES MARMORATUS *Say*: Oblongo-ovatus, niger, thorace pilis fulvis longius pubescente, maculis tribus minutis e pilis cinereis transversim positis, elytris maculis sparsis marmoratis et plaga magna humerali interius angulata e pilis albido-cinereis, subtus niveus, abdominis margine nigro-punctato, antennis rufo-piceis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Say*, Oeuvres entom. trad. par *Gory* p. 159. 1.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 139.

Habitat in California D. *Blaschke*; in Missouri et Arkansas Amer. septentr. frequens. D. *Say*.

184. ANTHRENUS APICALIS: Niger, creberrime punctulatus, parce griseo-pubescent, elytrorum apice pedibusque rufescentibus, thorace lato, basi sinuato, medio valde producto.

*Longit. 1 lin. Latit. 2/3 lin.*

Habitat in California D. *Blaschke*.

- 185. SAPRINUS CALIFORNICUS** *Eschscholtz*. Nigro-aeneus, ruguloso-punctatus, thorace antice foveolato, disco elytrorumque area antica communi laevibus, nitidis, striis quinque obliquis dimidiatis, suturali antice abbreviata, tibiis anticis sex dentatis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3 lin. Latit. 2, 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.*

**HISTER CALIFORNICUS** *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 142.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; e Museo Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole misit D. *Rouillier*.

- 186. SAPRINUS SULCIFRONS:** Subquadratus, convexus, nigro-aeneus, fronte lineis duabus, posteriore adscendente acuminata, impressis, thorace basi punctulato, elytris creberrime ruguloso-punctatis, relictis areolis scutellari, humerali et apicali externa laevibus, striis quatuor obliquis inaequalibus, tibiis anticis tridentatis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin.*

Habitat in California D. *Eschscholtz*. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

- 187. CEUTOCERUS ADVENA** *Schüppel*: Subquadratus, convexus, testaceus, nitidus, oculis nigris, thorace emarginato, basi bisinuato, lateribus deplanato, elytris subquadratis abdomen obtentibus, subtiliter striato-punctatis.

*Longit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Germar*, Coleopt. Spec. nov. p. 85. 146.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 144.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; cum rebus mercatorii certe allatus.

## PALPICORNIA.

\*188. **ELOPHORUS AURICOLLIS** *Eschscholtz*: Capite thoraceque viridi-aureis, punctato-rugosis, thorace angulis acutis, quinque sulcato, sulcis lœvibus, elytris griseis, interstitiis striarum alternis carinatis.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz*, Entomographien p. 43. 20.

Habitat in insula Unalashka D. *Eschscholtz*.

189. **CERCYON LIMBATUM**: Ovatum, convexum, nigrum, elytris tenue punctato-striatis, fusco-piceis, thoracis margine anguste, elytrorum late apiceque rufis.

VAR. b. elytris rufo-piceis dorso infuscatis.

VAR. c. elytris rufo-ferrugineis.

*Longit. 1 $\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $\frac{5}{6}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha DD, *Kuprianoff* et *Blaschke*.

C. **FLAVIPEDI** *Fabr. Erichs.* simile, sed brevius, fortius punctatum, elytrorum striis profundioribus et colore diversum.

190. **CERCYON ADUMBRATUM**: Oblongo-ovale, convexum, ferrugineum, elytris profunde punctato-striatis, dilutioribus, disco fusco-adumbratis.

VAR. b. obscurius, fusco-piceum, capite

thoraceque nigro-piceis, thoracis margine laterali testaceo, elytris disco latius infuscato.

*Longit. 1 lin. Latit. 2/5 lin.*

Habitat in insula Sithka DD. *Kuprianoff et Blaschke.*

Magnitudine C. ATOMARII *Fabr.* sed longius, minus globo-sum, elytra minus profunde punctato-striata, et interstitia plana.

## LAMELLICORNIA.

\*191. APHODIUS ALEUTUS *Eschscholtz*: Capite trituberculato, ater, thoracis dense punctati angulis, elytris pedibusque rufo-piceis, elytrorum striis punctatis, interstitiis seriebus punctorum subtilissimis.

*Longit. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Entomographien p. 27. 11.—*Sturm*, Cat. p. 95.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

\*192. APHODIUS GUTTATUS *Eschscholtz*: ater, capite quadrituberculato, elytris striis punctatis, maculis quadratis ferrugineis sparsis.

*Longit. 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Mém. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou VI. p. 97. 1.—*Sturm*, Cat. p. 95.

Habitat in simo bovino insulæ Unalaschkæ frequens D. *Eschscholtz*.

193. OXYOMUS CADAVERINUS *Eschscholtz*: Oblongus, supra nigro-subtus rufo-piceus, clypeo pro-

funde emarginato, thorace anterius dilatato varioloso, elytris punctato-striatis.

*Longit. 3 lin. Latit. 1 $\frac{2}{3}$  lin.*

*Aphodius CADAVERINUS Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 162.

Habitat in California, *Trogium* instar in cadaveribus exsiccatis D. *Eschscholtz*.

194. *OXYOMUS CYLINDRICUS Eschscholtz*: Oblongus, nigro-piceus, clypeo subintegro, transverso, rugoso, thorace crebre punctato, lateribus crenulato, basi sulcato, elytris punctato-striatis, interstitiis planis, punctis minutis subseriatis.

*Longit. 2 $\frac{1}{3}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 163.

*PSAMMODIUS CYLINDRICUS Eschscholtz*, Entomogr. p. II. 3.

Habitat in insula Unalaschka locis elevatis sub lapidibus et in insula Sitkha D. *Eschscholtz*.

195. *SINODENDRON RUCOSUM*: Nigrum, thorace rugoso-varioloso antice truncato, unidentato, capitis cornu recurvo, parce piloso, elytris valde rugoso-intricatis.

*Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh*; ab Excell. D. *Fischer de Waldheim* amicissime communicatum

Statura S. cylindrici, sed undique valde rugosum et thorace unidentato omnino diversum.

## HETEROMERA.

## MELASOMATA

\*196. *NYCTOPORIS CRISTATA* *Eschscholtz*: Nigra, capite cristato, thorace breviore varioloso, medio foveis duabus profundis, elytris cristis granulatis elevatis, humeris spinosis, basi abrupte declivibus.

*Longit. 6 $\frac{1}{2}$ , 7 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas IV. p. 11. Tab. 18. fig. 4.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 203.

Habitat in California, in littore meridionale Sinus St. Franzisco. D. *Eschscholtz*.

197. *NYCTOPORIS AEQUICOLLIS* *Eschscholtz*: Nigropicea, capite thoraceque quadrato variolo-punctatis; inæqualibus, elytris cristis granulatis subtilibus, humeris obtusis.

*Longit. 6 $\frac{1}{2}$ , 7 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas IV. p. 12.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 203.

Habitat in California, in littore septentrionali Sinus St. Franzisco D. *Eschscholtz*.

198. *EULAEIS BICARINATA* *Eschscholtz*: Oblonga, picea, thorace ruguloso-punctato, medio bicarinato, lateribus reflexis, subangulatis, elytris planatis costatis, interstitiis profunde striato-punctatis, pedibus rufis.

*Longit. 3 $\frac{2}{3}$ , 4 lin Latit. 1 $\frac{1}{2}$ , 1 $\frac{2}{3}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 15. 1. Tab. 14. fig. 8.—

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 203.

Habitat in California ad St. Franzisco locis e littore maris distantibus. DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

199. EULABIS RUFIPES *Eschscholtz*: Oblonga, picea, clypeo, antennis, thoracis lateribus pedibusque rufis, thorace profunde aciculato, æquali, lateribus rotundato, tenue marginato, elytris convexiusculis costatis, interstitiis profunde striato-punctatis.

*Longit. 2, 4 lin. Latit. 1, 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 15. 2.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 203.

Habitat in California ad St. Franzisco in vicinate Missionis, D. *Eschscholtz*.

\*200. EURYMETOPON RUFIPES *Eschscholtz*: Semicylindricum, atrum, antennis ferrugineis, pedibus rufo-piceis, thorace basi apiceque truncato, lateribus rotundato, elytris posterius declivibus, striato-punctulatis, striis remotis basi extrorsum curvatis, interstitiis internis irregulariter, externis subseriatim punctulatis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. IV. p. 8. Tab. 18. fig. 1.

Habitat in California ad St. Franzisco sub lapidibus D. *Eschscholtz*.

\*201. EURYMETOPON OCHRACEUM *Eschscholtz*: Oblongum, pallide ochraceum, capite paulo obscuriore, thorace subcylindrico, elytris medio

gibbosis posterius declivibus, subtiliter striato-punctatis, punctis basi et apice evanescentibus, interstitiis remote punctulatis, punctis subseriatis.

*Longit. 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. IV. p. 8. Tab. 18. fig. 2.

Habitat in California ad St. Franzisco sub lapidibus D. *Eschscholtz*.

202. APOCRYPHA ANTHICOIDES *Eschscholtz*: Oblonga, convexa, rufo-ferruginea, elytrorum dorso nigro, undique subtiliter punctulata, capite elytrisque pilis rarioribus, thorace densioribus, griseo-pubescentibus, thorace suborbiculato, antice truncato, elytris ovalibus.

VAR. b. Fusca, antennis pedibusque rufo-piceis, elytris macula utrinque humerali rufo-ferruginea.

*Longit. 1 $\frac{1}{2}$  lin. Latit.  $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. IV. p. 13. Tab. 18. fig. 7.

Habitat in California ad ripas fluviorum D. *Eschscholtz*.

VAR. b. a D. *Blaschke* captam amicissime dedit Excell. D. *Lange*.

203. AMPHIDORA LITTORALIS *Eschscholtz*: Oblonga, nigro-fusca, pilis longis raris fuscis villosa, thorace transverso, convexo, latitudine elytrorum, lateribus rotundato, antice posticeque truncato, crebre punctato, elytris dense

striato-punctatis, interstitiis angustis, seriatim subtilissime punctulatis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$ , 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$ , 1 $\frac{2}{3}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. IV. p. 13. Tab. 18. fig. 6.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 231.

Habitat in California locis planis ad littora maris, inter herbas et sub lapidibus D. *Eschscholtz*.

204. ELEODES SULCIPENNIS: Elongata, nigra, opaca, capite profunde punctato, thorace subcordato, lateribus tenue reflexo-marginato, subtiliter punctulato, elytris oblongis, profunde sulcatis, postice perparum dilatatis, apice attenuatis, valde declivibus, femoribus anticis dentatis.

*Longit. 14 $\frac{2}{3}$  lin. Latit. 5 lin.*

Habitat in California Excell. D. *Wrangel*. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

205. ELEODES GRANDICOLLIS: Elongata, nigra, supra convexa nitida, capite profunde punctato, thorace lateribus valde rotundato-ampliato, reflexo-marginato, subtiliter punctulato, elytris oblongis, versus apicem modice angustatis, levissime rugulosis, obsolete striato-punctatis, femoribus anticis dentatis.

*Longit. 14 $\frac{2}{3}$  lin. Latit. 4 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California DD. *Wrangel* et *Tschernikh*; specimen e Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop. ad describendum amicissime communicavit D. *Ménétriés*, alterum Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

206. ELEODES GIGANTEA: Elongata, nigra, supra nitida, thorace rotundato, supra convexo, basi apiceque latitudine æquali, femoribus muticis, elytris subtiliter granulato-punctatis, maris versus apicem sensim attenuatis, feminæ sesqui latioribus, pone medium dilatatis apice subito angustatis.

*Mas: Longit. 15 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 4 $\frac{1}{3}$  lin.*

*Femina: Longit. 16 lin. Latit. 5 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California Excell. D. Wrangel. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Gigas in hoc genere, statura sequentis nonnihil similis, multo major et forma magis elongata.

207. ELEODES DENTIPES *Eschscholtz*: Elongata, nigra, supra nitida, capite thoraceque subtiliter granulato-punctatis, thorace lateribus rotundato, basi coarctato, angulis anticis acuminatis, elytris subtiliter striato-punctatis, punctis granuliferis, femoribus anticis dentatis.

Mas: angustior, elytris pone medium sensim attenuatis.

*Longit. 8, 10 lin. Latit. 3, 3 $\frac{1}{2}$  lin.*

Femina: latior elytris medio paulo dilatatis, versus apicem declivibus, minus angustatis.

*Longit. 10, 12 lin. Latit. 4 4 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p: 10. t. Tab. 14. fig. 4.—

*Guérin*, Magas. de Zoologie. IV. p. 31. pl. 117. fig. 1. —  
*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 209.

Habitat in California ad St. Franzisco, locis elevatis DD.  
*Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh.*

208. ELEODES QUADRICOLLIS *Eschscholtz*: Oblonga, nigra, capite fortius, thorace subtilius punctulato, subquadrato, antice paulo latiore, modice rotundato, femoribus muticis.

Mas: subcylindricus, elytris thoracis fere latitudine pone medium angustatis declivibus, dorso dense striato-punctatis punctis granuliferis.

*Longit.* 7 lin. *Latit.*  $2\frac{1}{2}$  lin.

Femina: lata, obovata, elytris thorace fere duplo latioribus, mox pone humeros dilatato-rotundatis, pone medium rotundato-angustatis, declivibus, dorso rugulosis, subtiliter granulatis, obsolete striato-punctatis.

*Longit.*  $9\frac{1}{2}$  lin. *Latit.*  $4\frac{2}{3}$  lin.

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 12. 9. Tab. 14. fig. 5.—  
*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 209.

Habitat in California ad St. Franzisco, locis elevatis frequens DD. *Eschscholtz*.

209. ELEODES MARGINATA *Eschscholtz*: Oblonga, nigra, thorace transverso, medio crebre punctato, lateribus rotundato, granulis nitidis scabro, marginibus reflexis, elytris ovatis pone medium angustatis, granulis reclinatis scabris,

femoribus anticis maris dentatis , feminæ muticis.

*Longit. 7, 7<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin. Latit. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin.*

*Eschscholtz* , Zool. Atlas. III. p. 10. 2.—*Dejean* , Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 210.

Habitat in California ad St. Franzisco rarius DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

210. ELEODES *Fischeri*. Oblonga , nigra , thorace transverso , lato , medio punctato , lateribus valde rotundatis , tenue marginatis , granulis nitidis scabriusculis , elytris ovalibus , apice attenuatis , tuberculis piliferis subseriatis reclinatis dense asperatis , femoribus anticis muticis.

*Longit. 9 lin. Latit. 4 lin.*

*Mannerheim* , Revue Zoolog. par la Société Cuvierienne 1840. p. 137.

Habitat in California ad Ross. D. D.<sup>r</sup> *Fischer.*

Præcedenti affinis, thorace breviore , latiore, minus crebre punctato elytrisque longioribus magis rugosis et scabris ut et femoribus anticis muticis diversa.

211. ELEODES CLAVICORNIS *Eschscholtz* : Ovata , nigra , thorace lateribus rotundato tenue marginato, ibique et in medio punctato, area utrinque lævi , postice truncato angulis minutis rectis, elytris posterius sensim attenuatis, dorso nonnihil deplanatis; foveolis subquadratis seriatis impressis, lateribus granulatis et pilo-

sis, antennis articulis tribus ultimis præcedentibus duplo latoribus.

*Longit. 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas III. p. 11. 3.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit p. 210.

Habitat in California, locis planis ad littora maris D. *Eschscholtz*.

Specimina e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad examinandum benevole misit D. *Rouillier*.

212. ELEODES REFLEXICOLLIS: Ovata, nigra, thorace brevi, lato, subdepresso, basi subito-angustato, lateribus valde rotundatis, reflexo-marginatis, dorso crebre punctato, areis duabus lævigatis, elytris convexis, punctatis, punctis tuberculatis minutis nitidis instructis, humeris obtusis, anternis extrosum vix crassioribus.

*Longit. 6 lin. Latit. 3 lin.*

Habitat in California ad Ross. D. D.<sup>r</sup> *Fischer*.

Sequenti proxima, ejusdem magnitudine et statura, sed thorax latior, profundius punctatus, lateribus magis rotundatus, margine altius reflexo basique magis abrupte angustatus et elytra crebrius punctato-tuberculata, minime ut in illa costulis elevatis substriata.

213. ELEODES PLANATA *Eschscholtz*: Oblongo-ovata, nigra, thorace transverso, basi coarctato, lateribus valde rotundatis, tenui reflexo-marginatis, dorso dense punctato, areolis duabus lævigatis vix distinctis, elytris dorso depressis, seriatim foveolato punctatis, obsolete subco-

statis, humeris obtusis, antennis subfiliformibus.

*Longit. 6, 7 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 2 $\frac{5}{4}$ , 3 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas III. p. 12. 6.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 210.

Habitat in California ad Ross frequens D. *Eschscholtz*.

214. ELEODES PARVICOLLIS *Eschscholtz* : Ovata, nigra, thorace brevi transverso, lateribus rotundato, tenue reflexo-marginato, basi subito coarctato ibique latitudine apicis angustiore, dorso profunde punctato, lateribus dense granulifero, elytris dorso punctis majoribus subseriatis leviter impressis, lateribus granulatis, humeris subrectis margine nonnihil reflexo, antennis filiformibus.

*Longit. 5 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 11. 4.

Habitat in California ad St. Franzisco rarius D. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

215. ELEODES PRODUCTA: Oblonga, nigra, thorace lateribus rotundato, tenue marginato, basi angustato, ibique et apice latitudine æquali, dorso crebre punctato, lateribus dense granulifero, elytris oblongo-ovatis, pone medium attenuatis, dorso leviter punctatis, punctis granuliferis, versus latera asperatis, humeris rotundatis antrorsum nonnihil productis, antennis extrorsum paulo incrassatis.

*Longit. 6 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. Blaschke.

Præcedenti affinis, sed multo longior et angustior, thorace longiore et latiore, elytrisque undique asperatis, subrugosis imprimis diversa.

216. ELEODES SCABROSA *Eschscholtz*: Oblongo-ovata, nigra, thorace transverso punctatissimo, basi apiceque latitudine æquali, lateribus valde rotundato, granulis scabro, elytris ovatis dorso rude punctatis, subrugosis, lateribus granulatis asperis, humeris subrectis, antennis articulis tribus ultimis latioribus.

Mas: elytris latitudine thoracis.

Femina: elytris thoracè fere sesqui latioribus.

*Longit. 5, 5 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 2 $\frac{1}{4}$ , 3 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 11. 5.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 210.

Habitat in California ad St. Franzisco frequens DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh.*

217. ELEODES CORDATA *Eschscholtz*: Ovata, nigra, thorace transverso, sub-convexo, lateribus valde ampliato-rotundatis, basi sinuatim coarctato, angulis sub prominulis, undique tenue marginato, fortiter et crebre rugoso-punctato, elytris apice declivibus, dense punctato-rugosis et granulatis, lateribus tuberculis reclinatis valde exasperatis, humeris prominulis subrotundatis, antennis extrorsum leviter incrassatis.

Mas: antennis crassioribus, pedibus fortioribus, longioribus.

Femina: antennis et pedibus brevioribus, tenuioribus.

*Longit. 5, 7 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$ , 3 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas, III. p. 12. 7. Tab. 14, fig. 6.—  
*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 110.

Habitat in California ad St. Franzisco, locis elevatis sat frequens DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh*; etiam ad Ross a D. *Fischer* lecta.

218. *ELEODES INTRICATA*: Nigra, thorace transverso, lateribus valde rotundato ibique tenue marginato, basi subito coarctato, dorso profunde punctato, elytris convexis apice declivibus, tuberculis lœvigatis minutis densissimis rugoso-intricatis, humeris subrotundatis, antennis extrorsum parum crassioribus.

Mas: oblongo-ovata, elytris oblongis, thoracis fere latitudine antennis pedibusque longioribus et fortioribus.

*Longit. 5 lin. Latit. 2 lin.*

Femina: ovata, mare sesqui latior, elytris thorace latioribus, antennis pedibusque tenuioribus.

*Longit. 5 lin. Latit. 3 lin.*

Habitat in California ad Ross. D. D.<sup>r</sup> *Fischer*.

Sequenti affinis, thorace latiore, basi subito angustato, punctato, haud rugoso, elytris punctis asperatis multa minoribus, densioribus omnino distincta.

219. ELEODES TUBERCULATA *Eschscholtz*: Oblongo-ovata, nigra, thorace subconvexo, cordato, lateribus rotundato, tenue reflexo-marginato, basi coarctato, angulis rectis, supra rude et profunde rugoso-punctato, elytris convexis, tuberculis lævigatis reclinatis densis rugoso-asperatis, humeris rotundatis, antennarum articulis 5—8 suborbiculatis, tribus ultimis paullo crassioribus.

*Longit. 5, 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub>, 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 12. 8.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 210.

Habitat in California ad Cabo de los Reyes D. *Eschscholtz*; a DD. *Blaschke* et *Tschernikh* etiam allata.

220. ELEODES PIMELIOIDES: Brevis, nigra, opaca, capite, thoraceque lateribus rotundato crebre rugoso-punctatis, elytris subquadratis, apice valde declivibus, dorso deplanatis, crebre granulatis, granulis reclinatis asperis piliferis.

*Longit. 6 lin. Latit. 3 lin.*

Habitat in California Excell. D. *Wrangel*. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

Magnitudo E. *PARVICOLLIS*, sed statura brevi lata, elytris subquadratis a ceteris congeneribus diversa.

221. CONIONTIS VIATICA *Eschscholtz*: Oblonga, semicylindrica, convexa, nigra, opaca, thorace apice emarginato, angulis deflexis, lateribus tenue marginato, basi subtruncato, angulis productis acutis, dorso creberrime subtilissime

punctulato, elytris thorace paulo angustioribus, tenue marginatis, apice rotundatis, subtilissime parcus punctulatis.

Mas: differt antennis, ore et pedibus brunneo-piceis.

*Longit. 6, 7 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3, 3 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 7 1. Tab. 14. fig. 3.—

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 211.

Habitat in California ad Sinum St. Franzisco, in campis et viis argillaceis a D. *Eschscholtz* capta.

222. CONIONTIS *ESCHSCHOLTZII*: Oblonga, semicylindrica, convexa, nigra subnitida, thorace apice emarginato, angulis deflexis, antice et lateribus tenue marginato, basi subtruncato, dorso subtilissime minus crebre punctulato, elytris thorace paulo angustioribus, tenue marginatis, dorso, præsertim posterius, valde punctato-rugosis, pilis albis brevissimis obsitis.

Mas: minor, brevior, minus convexus, thorace latiore angulis posticis subrectis, lateribus parum sinuato, tibiis tarsisque anticis nonnihil dilatatis.

Femina: major, valde convexa, thoracis lateribus posterius sinuatis, angulis posticis productis rotundatis, tibiis tarsisque anticis mediocribus.

*Longit. 6, 7 lin. Latit. 3, 3 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Mannerheim*, Revue Zoolog. par la Soc. Cuvier. 1840.

p. 138.

Habitat in California ad Ross. D. D.<sup>r</sup> *Fischer*; specimen a D. Tschernikh missum etiam communicavit Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

223. CONIONTIS NEMORALIS *Eschscholtz*: Oblonga, convexa, nigra, subnitida, thorace breviore transverso, apice emarginato angulis vix deflexis, lateribus tenue marginato, basi subtruncato angulis productis acutis, dorso subtiliter crebre punctulato, elytris thoracis latitudine, tenue marginatis, versus apicem rotundato-angustatis, dorso profunde rugoso-punctatis, pilis brevissimis albidis obsitis.

Mas: elytris mox pone humeros versus apicem sensim angustatis, tibiis tarsisque anticis nonnihil dilatatis.

Femina: elytris pone medium versus apicem angustatis magis declivibus, tibiis tarsisque anticis mediocribus.

Variat antennis, pedibus et elytrorum apice brunneo-piceis.

*Longit. 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 6 lin. Latit. 1<sup>5</sup>/<sub>4</sub>, 3 lin.*

*Eschscholtz*, Zoolog. Atlas III. p. 8. 2.

C. CAMPESTRIS ? *Dejean*, Cat. p. 212.

Habitat in California ad St. Francisco locis arenosis inter arbusta D. *Eschscholtz*; etiam ad Ross a D. *Fischer* capta.

224. BLAPSTINUS PULVERULENTUS *Eschscholtz*: Oblongus, ater, antennis, pedibusque piceis, creberrime punctatus, thoracis angulis posticis

subrectis, elytris punctato-striatis, striis versus suturam profundius impressis.

*Longit. 2, 3 lin. Latit. 8/9, 1<sup>1</sup>/5 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 213.

Habitat in California DD. *Eschscholtz*, *Blaschke* et *Tschernikh.*

## TAXICORNES.

225. **COELUS CILIATUS** *Eschscholtz*: Rotundato-ovatus, convexus, brunneo-piceus, antennis brevissimis pedibusque rufo-piceis, thorace transverso, apice late emarginato, basi truncato, lateribus rotundato, ibique et apice tenue marginato, dorso subtiliter punctulato, elytris granulis scabris, corporis margine pedibusque pilis longis ferrugineis ciliatis.

*Longit. 3, 3<sup>1</sup>/2 lin. Latit. 1<sup>2</sup>/5, 2 lin.*

*Eschscholtz*, Zool. Atlas. III. p. 5. Tab. 14. fig. 1.—  
*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 215.

Habitat in California ad St. Franzisco, locis arenosis sub stercoratis exsiccatis D. *Eschscholtz*.

226. **PHALERIA PICTA** *Eschscholtz*: Brevis, subhemisphærica, punctulata, pallide rufo-ferruginea, thoracis basi utrinque bistriato, elytris punctato-striatis, in utroque macula media dentata nigro-fusca.

*Longit. 1<sup>1</sup>/2 lin. Latit. 1 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 216.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp.  
Mosqu.

227. STENE FERRUCINEA *Fabricius*: Lineari-elongata, depressa, rufo-ferruginea, thorace transverse quadrato, tenue marginato, confertissime subtiliterque punctulato, elytris tenue punctato-striatis, interstitiis punctulatis, antennarum articulis tribus ultimis majoribus perfoliatis.

*Longit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 2 lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Stephens*, Illustr. of British Entom. V. 9. Manual of British Coleopt. p. 322. 2531.

MARGUS FERRUGINEUS *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 222.

TROGOSITA FERRUGINEA *Fabr.* Syst. El. I. p. 155. 23. Ent. Syst. I. p. 116. 7.

TENEBRIUS FERRUGINEUS *Fabr.* Mant. I 212. 17. Spec. Ins. I. 324. 12. — Oliv. Ent. III. 57. p. 18. 25. Tab. 2. fig. 24. a. b.

COLYDIUM CASTANEUM *Herbst*, Natur-Syst. VII. p. 282. 3. Tab. 112. fig. 3. ε.

TENEBRIUS TESTACEUS *Schönherr* Syn. Ins. I. p. 153. 46.

PHALERIA CASTANEA *Gyllenhal*, Ins. suec. II. p. 588, 2.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke; per totum orbem terrarum obvia, animalia in Musæis asservata, panem aliaque cibaria destruens.

## TENEBRIONIDES.

## II. CENTRIOPTERA.

Antennæ moniliformes, articulis 1 et 2 brevissimis, 3 elongato, subcylindrico, 4—6 hoc triplo brevioribus, subquadratis, 7—9 lenticularibus rotundatis compressis, 10 brevi transversa subcyathiformi, ultimo parvo rotundato, apice acuminato.

Labrum exsertum, apice rotundatum, ciliatum.

Mandibulæ corneæ, validæ, intus unidentatæ, apice incurvo emarginato.

Maxillæ coriaceæ, extus membranaceæ, fasciculato-ciliatæ, muticæ.

Mentum corneum, tricarinatum, apice emarginatum.

Labium exsertum, profunde emarginatum, ciliatum.

Palpi omnes articulo ultimo præcedente parum longiore subobconico, apice truncato.

Corpus oblongum, apterum, statura fere CARABI.

Caput clypeo rotundato, jugulo crebre ruguloso, spatio medio triangulari rugis majoribus transversis instructo.

Pedes validi, femoribus versus apicem non-nihil incrassatis, interne profunde excavatis,

tibiis pilis brevibus rigidis exasperatis, apice bispinis, quatuor anterioribus perparum incurvis, posticis retrosum nonnihil curvatis, tarsis articulis compressis, convexis, 1—4 utrinque spinula armatis, unguiculis validis incurvis, muticis.

Nomen e *κέντρον* *spina* et *πτερόν* *ala* derivatum.

228. CENTRIOPTERA CARABOIDES: Nigra, nitida, capite profunde parce punctato, thorace elytris latiore, subcordato, anguste reflexo-marginato, subtilissime sparsim punctulato, elytris profunde striato-punctatis, lateribus posterius trifariam spinulosis.

*Longit. 13 lin. Latit. 4 lin.*

Habitat in California Excell. D. Wrangel. Mus. Imp. Acad. Scient. Petrop.

### III. COELOCNEMIS.

Antennæ extrorsum leviter incrassatæ, articulis 1 et 2 breviusculis, 8 elongato subcylindrico, 4—7 hoc fere duplo brevioribus extrorsum paulo incrassatis, 8 et 9 lenticularibus compressis, latere interiore nonnihil productis, subemarginatis, denticulo minuto subarmatis, 10 et 11 lenticularibus compressis rotundatis, muticis, ultimo perparum majore.

Labrum coriaceum, exsertum, transversum,  
apice subemarginatum.

Mandibulæ validæ, corneæ, apice emarginatae.

Maxillæ coriaceæ, apice bifidæ.

Mentum corneum, leviter bicarinatum, apice  
rotundatum.

Labium subexsertum, integrum, margine  
ciliato.

Palpi maxillares, articulo ultimo, magno,  
brevi, lato, oblique truncato, labiales articulo  
ultimo majore obconico, apice truncato.

Corpus subelongatum, apterum. Caput supra  
planum, clypeo truncato, sub-emarginato, la-  
teribus ante oculos ampliato, ibique nonnihil  
elevato, lobo utrinque oculis superposito, ju-  
gulo transversim crebre rugoso.

Pedes elongati, femoribus versus apicem  
nonnihil incrassatis, interne profunde excava-  
tis, tibiis præsertim anterioribus incurvis,  
omnibus spinulis duabus brevissimis termina-  
tis, latere interno extrorsum profunde cana-  
liculatis, in quatuor posterioribus canalicula  
lateribus dense spongioso-setosa, tarsis arti-  
culis subcompressis, subtus dense spongiosis,  
articulo ultimo longiore, unguiculis incurvis  
muticis.

Nomen e *κοῖλος*: *cavus* et *κινήμη* *tibia* com-  
positum.

229. COELOCNEMIS CALIFORNICA: Nigra, subnitida, crebre punctulata, thorace cordato, undique tenue marginato, elytris oblongis, tenue striato-punctatis, in singulo seriebus novem e punctis oblongis impressis.

*Longit. 7 $\frac{1}{3}$  lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. Blaschke; a D. Obert ad describendum amice communicata.

230. COELOCNEMIS DILATICOLLIS: Convexa, nigra, subnitida, subtiliter punctulata thorace subcordato, lateribus valde rotundato-dilatato, tenue marginato, elytris oblongo-ovatis, pone medium dilatatis, apice declivibus angustatis, in singulo seriebus acto striato-punctatis.

*Longit. 10 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 4 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. Eschscholtz; e Mus. Imp. Univ. Mosqu. ad describendum benevole misit Rouillier.

#### IV. CIBDELIS (\*).

Antennæ extrorsum leviter incrassatæ, articulis 1 et 2 breviusculis, 3 elongato, subcylindrico, 4—7 sensim brevioribus extororum

(\*) Diese drei neuen Gattungen machen, der verwachsenen Flügeldecken wegen, einen Uebergang zu der Familie der *Melasomen*, allein die Form des Kopfes mit den Fresswerkzeugen und der Beine weisen ihnen wieder einen Platz unter den *Tenebrioniden* in der Nähe von *Upis* an.

nonnihil incrassatis, 8—10 lenticularibus compressis, apice leviter emarginatis, ultimo præcedente plus quam duplo longiore, oblique ovato, apice subacuminato.

Labrum subexsertum, transversum, apice subtruncatum.

Mandibulæ validæ, corneæ, apice emarginatae.

Mentum corneum, rugosum, medio subcarnatum, apice rotundatum, basi constrictum.

Maxillæ coriaceæ, apice obtusæ, longe ciliatae.

Labium exsertum, apice integrum, subrotundatum, longe ciliatum paraglossis liciniatis.

Palpi omnes articulo ultimo magno breviato, subsecuriformi.

Corpus oblongum, apterum, elytris connatis. Caput supra planum, clypeo lato, apice leviter rotundato, lateribus ante oculos non-nihil elevato, jugulo leviter transversim stri-guloso.

Pedes mediocres, femoribus versus apicem haud crassioribus, tibiis anticis vix incurvis, omnibus spinulis duabus brevissimis terminatis, apice ipso dense spongioso-setosis, tarsis articulis subcompressis, subtus dense spongiosis, articulo ultimo elongato, unguiculis incurvis muticis.

Nomen a *κιβδηλί:* spurius.

231. CIBDELIS BLASCHKII: Nigra, thorace convexo, subquadrato, punctato-ruguloso, lateribus integro, modice rotundato, undique tenue marginato, elytris pone medium versus apicem angustato-rotundatis, humeris antrorsum productis, dorso subtiliter striato-punctatis, interstitiis tubercululis nitidis seriatim dispositis.

*Longit. 6 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3 lin.*

Habitat in California DD. Blaschke et Tschernikh.

232. NYCTOBATES SERRATA Eschscholtz: Elongata, nigra, opaca, crebre punctulata, thorace cordato, subdepresso, lateribus inaequaliter serrato, elytris posterius dilatatis, subtiliter seriatim punctatis, humeris rotundatis, tibiis omnibus rectis.

*Longit. 10 lin. Latit. 4 lin.*

IPATHINUS SERRATUS Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 225.

UPIS SERRATA Eschscholtz in litteris.

Habitat in California ad St Francisco D. Eschscholtz.

233. NYCTOBATES INERMIS Eschscholtz: Elongata, nigra, subnitida, capite thoraceque profunde punctatis, hoc subquadrato, anterius vix angustato, undique tenue marginato, elytris subtiliter punctulatis, striato-punctatis, posterius nonnihil dilatatis, humeris oblique subrotundatis, tibiis leviter incurvis.

*Longit. 10 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 4 lin.*

UPIS INERMIS Eschscholtz in litteris.

*IPHUTHINUS SAPERDOIDES* VAR. *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 225

Habitat in California ad St. Franzisco. D. *Eschscholtz*.

N. SAPERDOIDI Bosc valde affinis, sed diversa mihi videtur, capite thoraceque multo fortius punctatis, thorace latiore, anterius vix angustato, et elytris longioribus, parcus punctulatis.

234. PYTHO? SAHLBERGII: Elongatus, valde convexus, rufo-ferrugineus, capite thoraceque obscurioribus profunde punctatis, illo fronte transversim valde impressa, hoc brevi, subcordato, immarginato, basi apiceque truncato, lateribus anterius rotundato, elytris foveolis oblongis profundis crebre punctatis, apice laevigatis (\*).

Femina major, in elytris multo latior et pedibus brevioribus tenuioribus diversa.

Mas: Longit.  $3\frac{2}{3}$ ,  $4\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $1\frac{1}{4}$ ,  $2\frac{1}{2}$  lin.

(\*) Dieser Käfer ist wahrscheinlich der, als auf Sitkha vorkommend, von *Eschscholtz* (Reise um die Welt in den Jahren 1823—26 von *Kotzebue*, 2<sup>ter</sup> Th. Uebersicht der zoologischen Ausbeute von *Fr. Eschscholtz*, p. 26.) erwähnte BOROS. Seine stark gewölbte Gestalt macht ihn freilich einem BOROS täuschend ähnlich; allein bei genauerer Untersuchung findet man, dass die Fühlhörner und Fusswerkzeuge mit denen von PYTHO ganz übereinstimmen, nur ausgenommen dass das letzte Glied der Antennen nicht so scharf zugespitzt ist. Die convexe Form wäre wohl nicht eine wohlgegründete Anleitung ihn von der letztgenannten Gattung zu trennen.

*Femina: Longit. 4 $\frac{2}{5}$  lin. Latit. 1 $\frac{2}{5}$  lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz*, *Kuprianoff* et *Tschernikh*

### HELOPII.

#### V. EUCYPHUS.

Antennæ monitiformes, articulo primo longiore curvato, 2 et 3 paulo brevioribus æqualibus obconicis, 4—10 præcedentibus nonnihil brevioribus, inter se æqualibus subquadratis, compressis, ultimo paulo majore ovato apice rotundato.

Labrum exsertum, transversum, antice subemarginatum, ibique margine triangulariter incrassatum.

Palpi maxillares labialibus multo longiores, articulo ultimo magno securiformi; eodem labialium etiam majoris magnitudinis, triangulari, apice truncato.

Mandibulæ trigonæ, depressæ.

Mentum parvum, apice emarginatum.

Corpus globosum, forma fere HYBOSORI vel ACIALEÆ, antice posticeque inflexum. Caput sub thorace retractum, illoque angustius, rotundatum, oculis magnis oblongis. Thorax transversus, anterius angustatus. Scutellum conspicuum. Elytra valde convexa, gibba. Pedes breves, tibiis omnibus latiusculis, fulvo-

hirsutis, anticis latere interiore excavatis, medio in angulum dilatatis, quatuor posterioribus extrorsum profunde excavatis, extus in medio rotundato-dilatatis, ibique crebre spinulosis, tarsis breviusculis, subtus hirsutis, articulo antepenultimo subtus membrana oblonga instructo, unguiculis incurvis integris.

Nomen ab *εὐ valde et κυρὸς gibbus* derivatur.

**235. EUCYPHUS HYBOSOROIDES:** Supra piceo-æneus, glaber, nitidus, creberrime punctatus, subtus brunneo-piceus, antennis tarsisque rufo-ferrugineis.

*Longit. 3<sup>1</sup>/<sub>5</sub> lin. Latit. 2 lin.*

Habitat in California D. Blaschke.

**236. HELOPS CALIFORNICUS Eschscholtz:** Oblongus, fusco-æneus, capite thoraceque subquadrato creberrime punctatis, elytris striatis, in striis et interstitiis subtiliter punctulatis, antennis pedibusque piceis.

Mas: antennis capite cum thorace longiores, extrorsum crassiores.

Femina: antennis capite cum thorace breviiores, filiformes.

*Longit. 4 lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit, p. 231.

Habitat in California DD. Eschscholtz et Tschernikh.

## TRACHELIDES.

237. ANASPIS SERICEA. Elongata, brunneo-picea, supra holosericeo-pubescentia, antennarum basi, ore elytris pedibusque ferrugineo-testaceis, fulvo-sericeis.

*Longit. 1 $\frac{2}{3}$  lin. Latit.  $\frac{2}{3}$  lin.*

VAR. b. thoracis margine antico, angulisque posticis ferrugineis.

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke. VAR. b. in Museo Acad. Imp. Petropol. asservatur.

238. ANASPIS PALLESCENS Eschscholtz: Elongata, fulvo-ferruginea, subtilissime griseo-pubescentia, antennis extrorsum, oculis abdomineque nigro-fuscis.

*Longit. 1 $\frac{2}{3}$  lin. Latit.  $\frac{3}{4}$  lin.*

Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 242.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Præcedente paullo latior, præsertim in thorace, colore, pubescentia multo minus condensata, antennisque extrorsum crassioribns distincta.

## VESICANTIA.

239. EPICAUTA PUNCTICOLLIS: Atra, pubescens, capite thoraceque canaliculato, postice impresso, crebre et profunde punctatis, elytris creber-rimne rugoso-punctatis.

*Longit. 4 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California DD. *Blaschke* et *Tschernikh*; specimina descripta benevole communicaverunt DD *Fischer de Waldheim* et *Obert*. E. ATROTE *Fabr.* non nihil similis, sed multo profundius punctata.

## TETRAMERA.

### CURCULIONIDES.

240. APION CUPRESCENS: Oblongum, fusco-aeneum, griseo-pubescent, rostro longitudine thoracis cum capite, arcuato, thorace anterius angustato, profunde punctato, postice canaliculato, elytris oblongo-ovatis, punctato sulcatis, punctis in sulcis satis approximatis.

*Longit. cum rostro 1 1/2 lin. Latit. 1/2 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; specimen a D. *Obert* amicissime donatum.

241. APION TROGLODYTES *Schönherr*: Breve, nigrum, longius griseo-pubescent, rostro capite cum thorace breviore, parum arcuato, thorace subcylindrico, antrosum vix angustato, profunde et concinne foveolato-punctato, elytris ovatis, gibbis, sulcatis, sulcis remote punctatis.

*Longit. cum rostro 5/4 lin. Latit. 5/8 lin.*

Habitat in California D. *Blaschke*.

Ad Stirpis 2<sup>dae</sup>, Manipuli 1<sup>mi</sup> Centuriam 1<sup>mam</sup> operis Cel *Schönherr* pertinent ambæ.

\*242. SITONES CALIFORNICUS *Eschscholtz*: Oblongus, niger fuscocinereo-tomentosus et setulosus,

fronte canaliculata; rostro subcostato; thorace evidenter punctato, griseo-trivittato, antennis tibiisque anticus fusco-ferrugineis, oculis subdepressis.

*Schönherr*, Genera et Spec. Curcul. VI. p. 267. 28.

*SITONA CALIFORNICUS* *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 278.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

Magnitudo S. 8-PUNCTATI (op. *Schönh.*), paulo tamen latior; S. ORDINARIO (ejus. op.) habitu coloreque valde propinquus, dimidio autem minor; fronte haud retusa, tomentoque setuloso præcipue distinctus.

243. *SITONES SENICULUS*: Oblongus, subcylindricus, niger, cinereo-tomentosus et setosus, fronte canaliculata, rostro excavato, thorace profunde rugoso-punctato, lateribus vix rotundato, elytris profunde punctato-striatis, antennarum basi tibiisque ferrugineis.

*Longit. 1 2/3 lin. Latit. 1/2 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

244. *ALOPHUS ALTERNATUS* *Say*: Oblongo-ovatus, niger, fusco-cupreo-squamösus, thorace crebre ruguloso, dorso carinula parum elevata, abbreviata instructo, utrinque obsolete albido-lineato, elytris subtiliter punctato-striatis, nigro et pallido tessellatis, macula postica subargentea ornatis, interstitiis confertim granulatis.

*Schönherr*, Gener. et Spec. Curcul. II. p. 286. 2.

**CURCULIO ALTERNATUS Say** in litteris.

**VAR. b.** elytris etiam macula laterali ante medium obliqua niveo-squamosa.

*Longit. cum rostro 6 lin. Latit. 2 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat **VAR. b.** in insula Sitkha D. *Blaschke*. **VAR. a.** Amer. septentr. incola.

**245. LIXUS PORICOLLIS Eschscholtz:** Oblongus, niger, pube grisea dense obtectus, rostro breviore recto, carinato, thorace antice parum angustiore, dorso punctis nigris remotis variolosis impresso, basi soveolato, longitudinaliter anguste carinato, utrinque nigro-lineato, elytris subtiliter punctato-striatis, apice singulatim subacuminatis, fusco-trilineatis, femoribus muticis.

*Longit. cum rostro 4, 5 lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$ , 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit p. 295.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; Mus. Univ. Imp. Mosqu.

Ad Stirpis 2<sup>dæ</sup> Manipulum 1<sup>um</sup> Operis Cel. *Schönherr* adnumerandus.

**246. LIXUS MODESTUS Dejean:** Elongatus, niger, griseo-pubescent, rostro crassiusculo, modice arcuato, thorace conico breviore, dorso longitudinaliter excavato, elytris striato-punctatis, dense cinereo-squamulosis, maculis minutis albescientibus remotè adspersis, apice singulatim subacuminatis, femoribus muticis

*Longit. cum rostro 5 lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Dejean*; Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 296.

*LIXUS ADSPERSUS Eschscholtz* in litteris.

Habitat in California D. *Eschscholtz*. Mus. Imp. Univ. Mosqu. Stirpis 2<sup>dae</sup> Manipulo 1<sup>mo</sup> Operis Cel. *Schönherr* collocandus.

247. *HEILIPUS SCROBICULATUS*: Oblongus, ater, opacus, squalidus, undique inaequalis, scrobiculatus et verrucosus, antennis tarsisque piceis, fronte foveola impressa, rostro parum arcuato, thorace latitudine longiore, lateribus rotundatis, crenatis, dorso carinato, elytris granulis minutis adspersis, verrucis majoribus hinc inde immixtis.

*Longit. sine rostro 5 lin. Latit. 2 lin.*

Habitat in California D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole communicavit D. *Rouillier*. In Stirpe 1<sup>ma</sup> Operis *Schönherrii* inserendus.

248. *ANTHONOMUS BRUNNIPENNIS*: Nigro-piceus, tenuiter pubescens, thorace subconico, profunde rugoso-punctato, scutello cinereo-squamuloso, elytris punctato-striatis, brunneis, antennarum basi, tibiis tarsisque ferrugineis, femoribus anticis obsolete dentatis.

*Longit. sine rostro 2 lin. Latit. 1 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

\*249. *TRACHODES PTINOIDES Eschscholtz*: Femoribus muticis, piceo-niger, thorace oblongo, cari-

nato, elytris punctato striatis, hispidis, griseo-irroratis.

*Germar*, Col. Spec. nov. p. 327. 466.—*Schönherr*, Gen. et Spec. Curgul. III. p. 513. 1.

*PISODES PTINICOLLIS Sturm*. Cat. p. 184.

Habitat in insula Unalaschka D. *Eschscholtz*.

Magnitudo fere *ERIRHINI ACRIDULI* op. *Schönherr*.

250. *CENTRINUS CONFUSUS Say*: Oblongus, ater, sub-nitidus, rostro longitudine thoracis, tenui, valde arcuato, thorace antice angustato, confertim subtiliter punctato, dorso linea angusta, lœvi, notato, elytris striatis, striis in fundo punctulatis, interstitiis angustis, crebre striato-punctulatis:

Mas: thorace subtus spinis duabus, parallelis, arcuatis armato.

Femina: thorace subtus mutico.

*Schönherr*, Gen. et Spec. Curgul. III. p. 740. 6.

*RHYNCHÆNUS CONFUSUS Say* in litteris.

*BARIS SULCIPENNIS Eschscholtz*, *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p 312.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; in Florida a D. *Say* lectus.

Habitus fere *BARIDI* et *B. PICINO* op. *Schönherr*, nonnihil minor, præsertim angustior

251. *SPHENOPHORUS DISCOLOR Eschscholtz*: Oblongo-ovatus, niger, glaber, rostro crebre punctato, basi tumido, apice compresso, thorace oblongo disperse punctato, tenue canaliculato, elytris punctato-striatis, striis profunde exa-

ratis, interstitiis remote punctulatis, thoracis lateribus, elytrorum apice, corpore subtus pedibusque extus albidis.

*Longit. sine rostro 7 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 3 lin.*

*CALANDRA DISCOLOR*, Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 329.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. communicavit D. *Rouillier*.

252. *SPHENOPHORUS SUBCARINATUS*: Elongatus, niger, glaber, rostro canaliculato, basi tumido, thorace varioloso-punctato, plagis tribus longitudinalibus elevationibus, elytris opacis, anguste striatis et in striis punctis minutis remotis impressis, interstitiis impunctatis, suturali lævissimo nitido.

*Longit. sine rostro 4 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. *Eschscholtz*. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

S. *CONFUSO* Dejean, Schönh. affinis, sed longior, angustior.

253. *SITOPHILUS ORYZÆ Linné*: Oblongus, nigropiceus, opacus, rostro mediocri, striatim punctato, thorace depresso, elytris sub-breviore, confertissime profundius punctato; elytris confertim crenato-striatis, maculis quatuor rufescentibus notatis.

Mas: rostro crassiore, evidentius carinato, profunde striatim punctato.

Femina: rostro tenuiore, basi tantum cari-

nato, subtilissime striatim punctato, extrorsum laevi nitido.

*Longit. cum rostro 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

*Schönh.* Gen. et Spec. Curcul. IV. p. 981. 13.

*CURCULIO ORYZÆ Linnæi.* Syts. nat. I. IV. p. 1755. 192.

*CALANDRA ORYZÆ Fabr.* Syst. El. II. p. 438. 4.

*Oliv.* Entom. V. 83. p. 97. 34.—*CURCULIO* Tab. 7. fig. 81. a. b.

*Stephens* Illustr. of British Entom. IV. p. 9. 3.

Manual of British Coleopt. p. 216. 1671.

Habitat in iusula Sitkha D. Blaschke; in omnibus terræ regionibus inter grana Oryzæ obvius.

254. *COSSONUS PINIPHILUS Eschscholtz:* Nigro-piceus, glaber, supra parum convexus; rostro breviori, crassiori, apice modice dilatato, basi obsolete canaliculato, minus profunde punctato; thorace oblongo, remote sat profunde punctato, anterius angustato, basi leviter bispinuato et obsolete bis impresso, in impressione rude sat crebre punctato; elytris planiusculis profunde punctato-striatis.

*Longit. cum rostro 3 lin. Latit. 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.*

*Schönherr,* Gen. et Spec. Curcul. IV. p. 1002. 8.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 330.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

255. *RHYNCOLUS BRUNNEUS Eschscholtz.* Subcylindricus, rufo-piceus, glaber, antennis mediocribus, rostro longitudine capitidis, crebre pun-

ctato, canaliculato, thorace oblongo, anterius paulo angustato, profunde punctato, elytris profunde punctato-striatis.

*Longit. 2 lin. Latit. 1/2 lin.*

*Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 330.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz, Kuprianoff et Tschernikh.*

## XYLOPHAGI.

256. **HYLURCUS SERICEUS** *Eschscholtz.* Brevis, rufo-piceus, griseo-sericeus, thorace carinato, elytris squamulis, brunneis cinereisque variegatis, antennis pedibusque rufis.

*Longit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin. Latit. 1/2, 3/5 lin.*

*Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 331.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz et Blaschke.*

257. **HYLURCUS OBESUS** *Eschscholtz:* Brevis, nigro-piceus, cinereo-pubescent, antennis, palpis tarsisque rufis, elytris punctato-striatis, intersticiis tuberculato-rugulosis, thorace creberime punctato, longitudinaliter carinato, ante apicem impresso-constricto.

*Longit. 2<sup>5</sup>/<sub>4</sub> lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 331.*

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.*

H. **LIGNIPERDE** *Fabr.* affinis, sed duplo minor, punctura

crebriore et subtiliore et thorace breviore, anterius magis angustato, constricto diversus.

258. **HYLURGUS RUGIPENNIS**. Oblongus, subcylindricus, supra rufo-piceus, subtus nigro-fuscus, subtiliter cinereo-pubescent, thorace creberime punctulato, carinato, anterius angustato, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis fortiter tuberculato-rugosis.

*Longit. 2, 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 2/<sub>3</sub>, 5/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

**H. PALLIATO** *Gyllenhal* similis, sed major, longior.

259. **HYLURGUS PUMILUS**: Elongatus, ferrugineo-testaceus, capite thoracisque apice obscurioribus, thorace oblongo, crebre punctato, haud carinato, elytris profunde punctato-striatis.

*Longit 3/<sub>4</sub> lin. Latit. 1/<sub>5</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha DD. Kuprianoff et Blaschke.

260. **BOSTRICHUS CAVIFRONS**: Cylindricus, nigro-piceus, antennis, pedibus thorace subgloboso et elytris apice integris ferrugineo-testaceis, thoracis lateribus antrorum latius, elytrorumque subtilissime punctato-striatorum margine, sutura vittaque media nigro-fuscis, capite maris profunde excavato.

*Longit. 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 3/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

B. LINEATO *Oliv.* similis, sed angustior, capite profundius excavato elytrisque subtilius punctato-striatis diversus.

- 261. BOSTRICHUS SEPTENTRIONIS** *Leconte*: Oblongus, brunneus, subnitidus, longius griseo-pilosus, thorace ovato, crebre punctato, obsolete carinato, elytris integris, profunde striato-punctatis, intersticiis seriato-punctatis.

*Longit. 1 $\frac{2}{3}$ , 2 lin. Latit. 2/3, 3/4 lin.*

B. VILLOSUS VAR. *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 332.

Habitat in insula Sitkha D. *Kuprianoff*.

B. VILLOSO *Gyllenhal* certe valde affinis, sed longius griseo-pubescent, profundius punctatus et thorace medio evidenter carinato diversus mihi videtur.

- 262. BOSTRICHUS TERMINALIS**: Oblongus, crebre et profunde punctatus, nigro-piceus, pilis parvis erectis cinereis hispidus, thoracis elytrorumque apice rufis, elytris integris, antennis pedibusque rufo-ferrugineis.

*Longit. 3/4 lin. Latit. 1/3 lin.*

Habitat in California D. *Blaschke*.

- 263. BOSTRICHUS NITIDULUS**: Elongatus, nigro-piceus, nitidus, antennis tarsisque testaceis, thorace profunde punctato, antice asperato, elytris profunde striato-punctatis, apice subretusis, profunde canaliculatis.

*Longit. 3/4, 1 lin. Latit. 3/8, 1/2 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

**264. CIS VITULUS:** Oblongus, fusco-piceus, punctulatus, pube brevissima rigida adspersus, capite excavato, margine antico quadridentato, thorace apice cornubus duobus antrorsum porrectis armato, antennis pedibusque rufotestaceis.

*Longit. 1 $\frac{1}{5}$  lin. Latit. 2/3 lin.*

Habitat in California D. Tschernikh.

**265. LADRIDIUS QUADRICOLLIS:** Elongatus, depresso, glaber, ferrugineo-testaceus, oculis nigris, thorace oblongo-quadrato, obsolete canaliculato, medio utrinque foveolato, basi transversim impresso, angulis anticis lobato-productis, elytris oblongis, profunde striato-punctatis, apice obtusis

*Longit. 3/4, 1 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 5/12, 1/2 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

L. ANGUSTICOLLIS Gyllenhal affinis, sed major, præsertim in clytris multo angustior.

**266. LATRIDIUS PROTENSICOLLIS:** Elongatus, depresso, glaber, nigro-piceus, antennis, pedibus elytrisque ferrugineo-testaceis, his macula communi media nigrescente, thorace angustiore, oblongo-quadrato, canaliculato, medio utrinque foveolato, basi transversim impresso, angulis anticis lobato-productis, elytris profunde striato-punctatis, apice obtusis.

*Longit. 3/4 lin. Latit. 1/2 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

Præcedenti affinis, thorace angustiore, lateribus magis elevato-marginatis, elytris brevioribus et colore diversus.

267. LATRIDIUS CORDICOLLIS: Elongatus, depresso, glaber, ferrugineo-testaceus, capite subrotundato, thorace cordato, apice truncato, angulis rotundatis, basi transversim impresso, elytris oblongis, profunde striato-punctulatis, apice rotundatis.

*Longit. 1/2 lin. Latit. 1/6 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. Blaschke.

268. RHYZOPHAGUS DIMIDIATUS Eschscholtz: Linearis, subdepresso, nitidus, thorace oblongo-quadrato, subtiliter remote punctulato, elytris piceis, capite antice, elytrorum basi, antennis pedibus abdomineque rufo-ferrugineis.

VAR. b. Corpore toto ferrugineo-testaceo.

*Longit. 1 1/2 lin. Latit. 1/2 lin.*

Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 337.

Habitat in insula Sitkha D. Eschscholtz. Mus. Univ. Imp. Mosqu.

269. RHAGODERA TUBERCULATA Eschscholtz: Elongata, sordide nigro-fusca opaca, clypeo magno dilatato, explanato, thorace dorso bicostato, lateribus serrato, elytris conjunctim novemcostatis, interstitiis bifariam profunde striato-punctatis.

*Longit. 3 1/2 lin. Latit. 1 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 337.

Habitat in California D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole misit D. *Rouillier*.

270. *SILVANUS SEXDENTATUS* *Fabricius*: Elongatus, fusco-testaceus pubescens, thorace sulcato, utrinque sexdentato, elytris punctato-striatis, interstitiis alternis elevatioribus

*Longit. 1 1/4 lin. Latit. 1/3 lin.*

*Gyllenhal*, Ins. Suec. III. p. 406. 2.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 338.

*DERMESTES 6-DENTATUS* *Fabr.* Syst. El. I. 317. 25.

*COLYDIUM 6-DENTATUM* *Paykull*. Fauna Suec. III. p. 318. 2.

*COLYDIUM FRUMENTARIUM* *Fabr.* Syst. El. II. p. 557. 11.

*IPS FRUMENTARIA* *Oliv.* Entom. II. 18. p. 10. 14. Tab. 2. fig. 13. a. b.

*SILVANUS SURINAMENSIS* *Stephens* Illustr. of British Entom. III. p. 104. Manual of British Coleopt. p. 127. 1032.

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*; in granis Oryzæ certe allatus.

271. *TROCOSITA CHLORODIA*: Elongata, supra viridiæna, fronte canaliculata corporeque subtus cyanescentibus, capite thoraceque punctatis, hoc basin versus sinuato-angustato, elytris striato-punctatis, interstitiis seriato-punctatis.

*Longit. 7 1/2 lin. Latit. 2 1/3 lin.*

In nave e California ad Americam meridionalem iter faciente a D. *Blaschke* capta; verosimile Californiæ incola.

T. *VIRESCENTI* valde affinis et forsitan ejus varietas major.

272. **TROGOSITA VIRIDICYANEA**: Elongata, supra cyanea, viridi-micans, subtus virescens, fronte canaliculata, capite thoraceque crebrius punctatis, hoc versus basin rotundato-angustato, elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis seriato-punctatis.

*Longit. 6<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 2 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

A præcedente differt colore, capite thoraceque crebrius punctatis, elytris paullo brevioribus, subtilius striato-punctatis et thorace versus basin haud sinuato-angustato.

273. **TROGOSITA MAURITANICA Linné**: Elongata, de-pressa, supra nigra nitida, subtus rufo-picea, thorace cordato, elytris a thorace remotis, tenue punctato-striatis, interstitiis serie dupli punctatis.

VAR. b. rufo-ferruginea.

*Longit. 3, 4 lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>3</sub>, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> lin.*

Oliv. Entom. II. 19. p. 6. 2. Tab. 1. fig. 2. a. b.—*Gyllenhal*, Ins. succ. I. p. 72. 1.—*Stephens* Illustr. of British Entom. IV. p. 224. Manual of British Coleopt. p. 141. 1139.

**TROGOSITA CARABOIDES Fabr.** Syst. El. I. p. 151. 6.—*Schönherr*, Syn. Ins. p. I. 155. 5.—*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 339.

**TENEBRI MAURITANICUS Linné** Syst. Nat. I. II. p. 674. 4.

Habitat in insula Sitkha in cibariis et pellibus D. *Blaschke*; per totum orbem terrarum obvia.

274. *TROGOSITA PUSILLIMA*: Elongata depressa, pallide rufo-testacea, thorace basi transversim impresso, lineolis tribus exarato, in medio foveolato, elytris subtiliter crebre punctulatis, stria suturali profunde impressa.

*Longit. 1/2 lin. Latit. 1/6 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

275. *CUCUJUS PUNICEUS Eschscholtz*: Elongatus, depresso, late sanguineus, antennis nigro-fuscis, pectore abdomineque rufo-ferrugineis, thorace subrotundato, lateribus leviter denticulato, supra obsolete bisulcato.

*Longit. 6 1/2 lin. Latit. 1 5/4 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 340

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. benevole communicavit Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

*C. DEPRESSO Fabr.* longior, angustior, colore et capitis thoracisque structura diversus *C. CLAVIPEDE Oliv.* adhuc multo longior et ab illo colore, thorace rotundato et capite postice minus producto distinctus.

276. *LÆMOPHLOEUS LONGICORNIS*: Oblongus, planus, rufo-testaceus, subtiliter punctulatus et pubescens, thorace transverso mutico, apice tenue marginato, basi angustato, supra tenue bistriato, elytris ferrugineis utrinque tristriatis.

Mas: Antennæ corpore multo longiores, articulis 1—4 brevibus subobconicis, 5—10

antecedentibus fere duplo longioribus subcylindricis, ultimo adhuc paulo longiore, apice rotundato.

Femina: Antennæ longitudine capitis cum thorace, moniliformes, articulis subrotundatis, duobus primis et tribus ultimis majoribus.

*Longit. 2/3 lin. Latit. 4/3 lin.*

Habitat in insula Sitkha D. *Blaschke*.

L. TESTACEO *Fabr.* minor, latior et antennis maris longioribus tenuioribus diversus.

## LONGICORNIA.

277. SONDYLIS UPIFORMIS *Eschscholtz*: Elongatus, niger, crebre rugoso-punctatus, thorace subcordato, elytris lineis tribus elevatis ad apicem fere extensis.

*Longit. 6 1/2 lin. Latit. 2 1/4 lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 341.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole misit D. *Rouillier*.

Minoribus S. *Buprestoidis* individuis adhuc minor, angustior, thoracis forma et punctura omnium partium alia distinguendus.

\*278. ASEMUM ATRUM *Eschscholtz*: Atrum, thorace punctulato, elytris lineis elevatis obsoletis.

*Eschscholtz*, Bullet. de la Soc. Imp. des natur. de Moscou II. p. 66.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

279. OPSIMUS QUADRILINEATUS *Eschscholtz.* Elonga-  
tus, brunneo-testaceus, subtilissime punctula-  
tus, pube cinereo-flavescente obductus, capite  
et thorace linea media, elytrisque in utroque  
lineis binis longitudinalibus, elevatis glabris.

Mas: Antennis corpore interdum longiori-  
bus, paullo crassioribus, elytris thorace plus  
quam triplo longioribus.

Femina: Antennis corpore multo breviori-  
bus, tenuioribus, elytris thorace quadruplo  
longioribus.

*Longit. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 5 lin. Latit. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 1<sup>2</sup>/<sub>5</sub> lin.*

*Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 354.*

Habitat in insula Sitkha DD. *Eschscholtz, Kuprianoff,*  
*Fischer, Blaschke et Tschernikh;* individuum in Cali-  
fornia captum etiam misit D. *Tschernikh*, verosimile  
navibus istuc allatum.

280. CLYTUS NAUTICUS: Nigro-piceus, obscurus,  
supra parcus, subtus dense cinereo-pubescent,  
thorace rugoso-punctato, lateribus et lineis  
duabus longitudinalibus, elytris macula fasciis-  
que duabus flexuosis cinereo-pubescentibus,  
his basi, margine suturaque testaceis.

*Longit. 7 lin Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>5</sub> lin.*

Lectus a D. *Blaschke* in nave e California iter faciente  
ideoque ut illius regionis incola putandus.

## CHRYSONELINÆ.

281. DONACIA GERMARI *Eschscholtz*: Viridi-cuprea, antennis nigris, articulis exterioribus basi pedibusque rufis, thorace oblongo-quadrato subtilissime punctulato, antice binodulo, elytris crenato-striatis, interstitiis transversim rugulosis, femoribus posticis unidentatis.

VAR. b. fusco-ænea, elytris levius striato-punctatis, subtilius transversim rugulosis, segmentis ventralibus late ferrugineis.

*Longit. 3 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 383.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*. VAR. b. in Museo Univ. Imp. Mosqu. asservata.

282. DONACIA FLAVIPENNIS *Eschscholtz*: Ferrugineo-testacea, capite antennisque nigris, thorace oblongo-quadrato, posterius angustato, rufo, antice binodulo, elytris crenato-striatis, interstitiis transversim rugulosis, femoribus posticis unidentatis.

*Longit. 3 $\frac{1}{3}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 383.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ad describendum benevole communicavit Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

Statura fere præcedentis, sed multo angustior et aliter coloratus, elytris profundius striato-punctatis punctis inter se remotioribus etiam diversa.

283. *SYNETA CARINATA* *Eschscholtz*: Elongata, ferrugineo-testacea, ore thoracis elytrorumque marginibus pallidioribus, thorace lateribus unidentato, elytris costis utrinque binis argute elevatis.

*Longit. 4 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 385.

Habitat in insula Sitkha D. *Eschscholtz*; e Mus. Univ. Imp. Mosqu. ab Excell. D. *Fischer de Waldheim* missa.

284. *ODONTOTA RUBROLINEATA*: Oblonga, capite thoraceque profunde punctatis nigris, elytris profunde punctato-striatis atro-cyaneis, thorace macula utrinque lateralí elytrisque linea longitudinali media rubris, corpore subtus coeruleo.

*Longit. 2 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

285. *COPTOCYCLA AURISPLENDENS* *Eschscholtz*: Subhemisphaerica, rufso-ferruginea, margine omni explanato, elytris leviter striato-punctatis, lateribus compressis, utrinque anterius in dorso foveola leviter impressa infuscata, corpore subtus antennisque extrorsum nigris.

*Longit. 2 $\frac{1}{2}$ , 2 $\frac{3}{4}$  lin. Latit. 2, 2 $\frac{1}{4}$  lin.*

*C. SEXPUNCTATA* VAR. *Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 397.

Habitat in California D. *Eschscholtz.*

*C. SEXPUNCTATA* *Fabr.* certe valde affinis, sed diversa mihi videtur, magnitudine semper minore, margine thoracis

elytrorumque minus explanato-dilatatis, elytris angulis humeralibus multo minus productis, striis crebre punctatis, foveola tantum unica dorsali levius impressa et corpore subtus fere toto nigro, ano tantum rufescente.

286. **CASSIDA NOVEMMACULATA**: Subovata, rufo-testacea, margine explanato ferrugineo, in elytris reflexo, elytris profunde striato-punctatis, lateribus vix compressis, thorace maculis tribus, elystrisque utrinque tribus, scutello antennarum apice corporeaque subtus cum pedibus nigris.

*Longit. 3 $\frac{1}{3}$  lin. Latit. 2 $\frac{1}{4}$  lin.*

Habitat in California DD. *Blaschke et Tschernikh.* Color in vivis læte sanguineus auro-splendens.

287. **GALLERUCA FLAVOLIMBATA**: Viridi-ænea, cærulencenti-micans, capite, thorace, pedibus elytrorumque margine flavo-testaceis, capite plaga verticali thoraceque maculis tribus virescentibus, tibiis externe tarsisque infuscatis, femoribus interdum nigro-maculatis.

*Longit. 3 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California DD. *Blaschke et Tschernikh; a DD. Fischer de Waldheim et Obert communicata.* Magnitudo et fere statura *G. CALMARIENSIS Paykull.*

288. **GALLERUCA PUNCTIPENNIS**: Subdepressa, nigra, thorace flavo maculis tribus nigris, ore, antennarum articuli primi apice, geniculis, tibiarumque basi flavis, elytris concinne punctulatis.

*Longit. 3 $\frac{1}{4}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

Statura et magnitudo G. *NYMPHÆAE*, elytris totis nigris, regulariter concinne punctulatis ab illa mox distinguenda.

289. **DIABROTICA TRIVITTATA:** Oblonga, nigra, thorace fulvo, biimpresso, femorum basi elytrisque pallide flavis, his costulatis, interstitiis bifariam striato-punctatis, vitta media lata et sutura nigris.

*Longit. 2 $\frac{2}{3}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

D. *VITTATÆ* *Fabr.* affinis, paullo major, nigredine suturali latiore, tibiis totis femorumque maxima parte nigris præcipue diversa.

290. **DIABROTICA DUODECIMPUNCTATA** *Fabricius:* Oblonga, flava, capite, antennis extrorsum, pectore, femoribus extus, tibiis, tarsis elytrorumque maculis in singulo sex per paria dispositis, nigris.

*Dejean, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 405.*

**CRIOCERIS 12-PUNCTATA** *Fabr.* Syst. El. I. p. 547. 39.—*Schönherr*, Syn. Ins. II. p. 273. 40.

**GALLERUCA 12 PUNCTATA** *Fabr.* Ent. Syst. I. II. p. 15. 12.

VAR. b. in omni puncto simillima, sed antennis nigris, articulis tribus primis basi testaceis et corpore subtus cum pedibus nigro, subtiliter griseo-pubescente.

GALLERUCA 11-PUNCTATA *Eschscholtz* in litteris.

*Longit. 3 $\frac{1}{3}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California DD. *Eschscholtz* et *Tschernikh* ;  
VAR. b. ibi tantum invenitur , anne re vera species distincta ?

291. GRAPTODERA PLICIPENNIS : Oblonga , convexa , supra cœrulea, subtus cyanea , capite rugoso-punctato , thoracis apice vix angustiore , thorace disperse , elytris creberrime punctulatis , his costa marginali elevata posterius ambiente ibique ad suturam connexa.

*Longit. 2 $\frac{1}{2}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh*.

Statura G. JANTHINÆ *Illiger*, sed in elytris longior et multo subtilius et crebrius punctulata , thorace levius transversim impresso et costa marginali elytrorum distincta. (\*)

282. GRAPTODERA CALIFORNICA : Oblongo-ovata, convexa , cœrulea , capite thoracis apice multo

(\*) In *Dejean's Catalog.* p. 412. findet sich als Varietät von GRAPTODERA PLICATA *Klug* eine COSTATA *Mannerh.* von der Nordwest Küste Amerikas. Ich bekam freilich von dem verstorbenen Professor *Stscheffloff* einige Stücke dieses Käfers , mit einer solchen Angabe des Vaterlandes; allein da der fragliche Käfer dort sehr häufig vorkommen sollte und nicht von den auf der Insel Sitkha gewesenen Sammler *ex professo* gefunden worden ist , muss ich jetzt die Angabe des Herrn *Stscheffloff* bezweifeln.

angustiore, thorace obsoletissime punctulato, linea transversa postica levissime impressa, elytris subtiliter punctulatis.

*Longit. 2 $\frac{1}{3}$  lin. Latit. 1 $\frac{1}{4}$  lin.*

Habitat in California ad Ross D. *Fischer*.

Statura G. OLERACEÆ, sed major thorace convxiore, obsoletissime transversim impresso et elytris subtilius punctulatis distincta.

293. **DISONYCHA MARITIMA**: Rotundato-ovata, crebre punctulata, nigra, fronte macula, thorace, elytrorum vittis duabus postice cōnnexis anōque flavis.

VÄR. b. capitis macula thoraceque fulvo-croceis.

*Longit. 2 lin. Latit. 1 $\frac{1}{2}$  lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 414.

Habitat in California, in plantis ad littora maris DD. *Eschscholtz* et *Blaschke*.

294. **CHLAMYS CONSPERSA**: Nigro-fusca, foveolato-punctata, thoracis medio pulvinato, elytris tuberculis elevatis scabris, sutura, crenata, fronte, thoracisque apice maculis majoribus notatis, thoracis disco, elytris et pedibus guttis minutis luteis conspersis.

*Longit. 1 lin. Latit. 2 $\frac{1}{3}$  lin.*

Habitat in California D. *Tschernikh.*

295. **PACHYBRACHYS SIGNATIFRONS**: Niger, confertim punctatus, elytris extrorsum punctato-striatis,

capitis macula magna furcata , thoracis margine laterali , elytrorum basali et subhumerali , femorum basi et macula antica flavo-ferrugineis.

*Longit. 1 $\frac{1}{4}$  lin. Latit.  $\frac{3}{4}$  lin.*

Habitat in California D. Tschernikh.

296. CRYPTOCEPHALUS CHALCONATUS : Cupreo-aeneus , fronte , ore , antennis , thorace subtus et lateribus pedibusque rufo-ferrugineis , thorace convexo , postice punctis utrinque quatuor impressis , elytris seriato-punctatis.

*Longit. 1 lin. Latit.  $\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. Blaschke , a D. Obert communicatus.

### TRIMERA.

297. HIPPODAMIA VITTIGERA : Oblongo-ovata , nigra , minus convexa , macula frontali , thoracis margine antico et laterali lineaque media , elytrisque margine et vitta longitudinali rufo-testaceis.

*Longit. 2 $\frac{1}{3}$  lin. Latit.  $1\frac{1}{2}$  lin.*

Habitat in California D. Tschernikh.

298. COCCINELLA CALIFORNICA Eschscholtz : Hemisphaerica , nigra , capite maculis duabus , thorace utrinque macula apicis elytrisque juxta

scutellum albidis, elytris rufis, macula scutellari suturaque nigris.

VAR. b. elytrorum albedine juxta scutellum deficiente.

*Longit. 2<sup>2</sup>/<sub>3</sub> lin. Latit. 2<sup>1</sup>/<sub>3</sub> lin.*

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 457.

Habitat in California DD. *Eschscholtz et Blaschke*. VAR. b. a D. *Tschernikh* captam misit Excell. D. *Fischer de Waldheim*.

299. SCYMNUS MARGINICOLLIS : Subhemisphaericus , niger , pubescens , ore , antennis thoracisque margine antico et laterali rufo-ferrugineis.

*Longit. 1 lin. Latit. 5/<sub>4</sub> lin.*

Habitat in California D. *Blaschke*.

S. PARVULE *Fabr.* statura et magnitudine similis , niger , undique sat dense griseo-pubescentes , ore , antennis thoracisque margine antico et laterali tantum rufescentibus.

### DIMERA.

\*300. BATRISUS ALBIONICUS *Eschscholtz* : Elongato-subcylindricus, convexus, niger, capite majusculo , in vertice tuberculo parum elevato , medio fossula vix perspicua impresso et sulco laevi circumducto , adjectis foveolis posticis duabus rotundatis , thorace trapezoidal , in medio lineola brevissima et utrinque singula

integra ante basin cum tribus foveolis con-  
junctis, his foveolis sulco transverso bisinuato  
connexis, elytris castaneo-testaceis.

*Longit. 1<sup>5</sup>/<sub>8</sub> lin.*

*Aubé* in *Guérin Magasin de Zoologie*. III. p. 49 6.

*Dejean*, Cat. 3<sup>me</sup> édit. p. 466.

Habitat in California D. *Eschscholtz*.

